



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (เวลา 08.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 06.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เกาะช้าง	ตราด	75.1	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	นราธิวาส	30.8	ฝนตกปานกลาง
3	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	26.6	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	จันทบุรี	21.3	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	ระนอง	21.2	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,385 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,446 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (39,433 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 1,048 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 58.20 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 92.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,952 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,979 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,440 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (36,961 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 982 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 51.25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 81.99 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,947 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนภ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนภ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุที่ รนภ.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รนภ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนภ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนภ.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	10,242	41	3,497	19	80	1,083	580	54	489	49	88	25,908	10,822	42	3,986	21	15,086
ตอน	12	8,368	3,162	38	1,510	22	226	2,061	982	48	817	43	238	10,429	4,144	40	2,327	27	6,285
กลาง	3	1,419	255	18	195	14	27	419	117	28	93	24	30	1,838	372	20	288	16	1,466
ตะวันตก	2	26,605	17,126	64	3,849	29	8	164	52	32	41	27	10	26,769	17,178	64	3,891	29	9,590
ตะวันออก	6	1,515	493	33	399	28	52	1,006	401	40	345	36	58	2,520	894	35	744	31	1,626
ใต้	4	8,194	4,701	57	2,990	46	42	679	274	40	220	35	46	8,874	4,975	56	3,211	45	3,899
รวม	35	70,926	35,979	51	12,440	26	435	5,411	2,406	44	2,006	40	470	76,337	38,385	50	14,446	28	37,952

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แคว้น้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,904 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,208 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 14.28 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 38.75 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,967 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,675	42	1,875	19	3.94	6.72	25.00	20.00	7,787
สิริกิติ์	3,908	41	1,058	16	8.09	8.08	9.00	9.00	5,602
ภูมิพล+สิริกิติ์	9,583	42	2,933	18	12.03	14.80	34.00	29.00	13,389
แคว้น้อยฯ	204	22	161	18	2.04	2.48	3.46	3.46	735
ป่าสักชลสิทธิ์	118	12	115	12	0.21	0.64	1.30	1.30	842
รวมทั้งหมด	9,904	40	3,208	18	14.28	17.92	38.75	33.76	14,967

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 19 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (19%) อ่างฯ สิริกิติ์ (16%) อ่างฯ แคว้น้อยบำรุงแดน (18%) อ่างฯ แม่มอก (28%) อ่างฯ น้ำพุ (14%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (14%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (7%) อ่างฯ ลำตะคอง (24%) อ่างฯ สิรินคร (13%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (12%) อ่างฯ กระเสี้ยว (11%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (29%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (28%) อ่างฯ ชุนด่านปราการชล (13%) อ่างฯ คลองสิยยัด (12%) อ่างฯ บางพระ (28%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (24%) อ่างฯ แก่งกระจาน (28%) และอ่างฯ ปรานบุรี (14%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 451 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 498 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.04 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.66 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.66 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.59 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 139 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 143 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 117 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 15 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 7 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 42 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 42 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 11 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 11 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 189 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 186 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) 18 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสี้ยว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสี้ยว 9 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 70 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 22 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 192 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 124 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		12 มิ.ย. 67	13 มิ.ย. 67	14 มิ.ย. 67	15 มิ.ย. 67	16 มิ.ย. 67	17 มิ.ย. 67	18 มิ.ย. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแคว จ.ปทุมธานี	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.บุรี จ.นนทบุรี	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	0.29	0.29	0.27	0.28	0.29	0.29	0.29	ปกติ	

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 18 มิ.ย. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.43	-9.37
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	6.02	-9.98
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.33	-8.87
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	3.59	-8.41
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	3.65	-8.85
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	4.06	-10.44

หมายเหตุข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีวันที่ 17 มิถุนายน 2567

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ตาก เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ ศรีสะเกษ อุทัยธานี กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร(เมือง โกสัมพินนคร พรานกระต่าย คลองลาน ปางศิลาทอง คลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี ลานกระบือ) สุโขทัย(เมือง ศิริมาศ กงไกรลาศ) พิษณุโลก(บางระกำ) ตาก(วังเจ้า) เลย(วังสะพุง เอราวัน) หนองบัวลำภู(นาวัง นากลาง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา โนนสัง เมือง) อุดรธานี(บ้านผือ กุดจับ หนองวัวซอ) มหาสารคาม(นาเชือก บรบือ พืชคามภูมิพิสัย นาตุน) นครราชสีมา(นครบุรี เลิงสาบ โชคชัย หนองบุญมาก จักราช ห้วยแถลง ชุมพวง ลำทะเมนชัย) สุรินทร์(ปราสาท ลำดวน ศีขรภูมิ สำโรงทาบ ชุมพลบุรี เมือง) บุรีรัมย์(คูเมือง โนนดินแดง ละหานทราย บ้านกรวด โนนสุวรรณ หนองกี่ หนองหงส์ ปะคำ ลำปลายมาศ นางรอง ชำนิ แคนดง) ร้อยเอ็ด(พุทธรักษา เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน) นครสวรรค์(แม่่วงก์ ลาดยาว แม่เป็น ชุมตาบง บรรพตพิสัย) ศรีสะเกษ(ปรางค์กู) อุทัยธานี(ลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต ทัพทัน หนองฉาง) กาญจนบุรี(ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ เมือง หนองปรือ ปอพลอย) และ จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง)

- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่) เขื่อนห้วยหลวง(อุดรธานี) อ่างเก็บน้ำทับเสลา(อุทัยธานี) เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ(นครราชสีมา) เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์(กาญจนบุรี) อ่างเก็บน้ำระเสียว(สุพรรณบุรี) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 24 อ่าง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 มิถุนายน 2567)

- การปฏิบัติการฝนหลวง 124 วัน จำนวน 2,361 เที่ยวบิน (3,569:520 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 1,815.325 ตัน และปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 1,181 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 71 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ น่าน พิจิตร แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุดรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมย์ นครราชสีมา หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด เลย มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ชุมพร พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง ยะลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุปโภค-บริโภค พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ประจำสัปดาห์วันที่ 3 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2567 งานระบายน้ำหลาก จำนวน 1 เครื่อง ในเขตจังหวัดนนทบุรี งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 26 เครื่อง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครนายก นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67)

5.1 ภัยแล้ง ช่วงภัย 27 มี.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความกระทบ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 30,888 ราย รวมพื้นที่ 100,944 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,504 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 60,115 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 37,324 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,527 ราย รวมพื้นที่ 7,484 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 659 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 711 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 6,115 ไร่ คิดเป็นเงิน 27.04 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 35 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 62.60 ไร่ วงเงิน 253,405 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ น่าน ตาก พะเยา สุโขทัย เพชรบุรี นครสวรรค์ ลำพูน อุทัยธานี หนองคาย เลย นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 672 ราย รวมพื้นที่ 1,501 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 80 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 904 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 518 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.99 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 236 ราย (คิดเป็นร้อยละ 35.12 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 730 ไร่ วงเงิน 1.56 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.01 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. - 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,209 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,312,671 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 991,142 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 318,811 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,970.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 152,562 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 1,282,383 ไร่ วงเงิน 1,928.05 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา และจังหวัดยะลา เกษตรกร 989 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 11,176 ตัว แบ่งเป็น โค 1,001 ตัว กระบือ 18 ตัว สุกร 12 ตัว แพะ/แกะ 287 ตัว และสัตว์ปีก 9,858 ตัว แปลงหญ้า 1,367 ไร่ คิดเป็นเงิน 34.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

5.4 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 - 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 31,993 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 361,014 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 241,575 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 119,346 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 560.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 26,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 287,621 ไร่ วงเงิน 453.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.01 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 2. โรครไหม้ข้าว 3. หนอนกอข้าว 4. โรครใบจุดสีน้ำตาล 5. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (น่าน) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี และสงขลา) จำนวน 46 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และอ่างทอง) จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 1,749 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1,040 ไร่</u>	- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ไข่น้ำออกจากแปลงนา - ถ้าพบอาการของโรครไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร - เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไข่น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลาย หนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง - เมื่อพบอาการของโรครใบจุดสีน้ำตาลรุนแรง ควรพ่นด้วย สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น อิติเฟนฟอส หรือคาร์เบนดิมิม เป็นต้นโดยพ่นตามอัตราคำแนะนำของฉลาก - เมื่อพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล อัตรา 30-50 มล. และคาร์โบซัลแฟน อัตรา 80-110 มล. โดยผสมน้ำพ่น 20 ลิตร
มะพร้าว	1. โรสสีขามะพร้าว 2. แมลงดำหนาม 3. หนอนหัวดำ 4. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร และตรัง) จำนวน 477 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 16,275 ไร่ <u>การระบาดลดลง 542 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 46,573 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 916 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,358 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u>	- ป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยมะพร้าวติดจัน จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้ สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง - แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปล่อยแตนเบียน เตตระสติคัส (โดยปล่อยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน) - ปล่อยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปล่อยแตนเบียน ไช่ทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และ เก็บเศษซากพืชนำไปเผาออกแปลงทันที และหมั่นสำรวจ สวมมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตตาโรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 941 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกุหลาบ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,269 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 349 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,308 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,371 ไร่ การระบาดลดลง 116 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 159 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 110 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 422 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียมเพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน - พันเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พันให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ซ่อดอกที่ผ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ผีดพ่นที่แผ่นใบ
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา 3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 4. โรคหน้ำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,430 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 32 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,167 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย กระบี่ ปัตตานี พังงา และสงขลา) จำนวน 28,804 ไร่ การระบาดลดลง 64 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร ชุมพร ตรัง และสงขลา) จำนวน 4,800 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่	- คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคกลากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยางควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. โรแดงมันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรครูปต่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น มุกดาหาร จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 137 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 15,340 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุรินทร์ จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 446 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์หนองคาย อุดรธานี ชัยนาท ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี) จำนวน 191,172 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 688 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบต่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรองแปลงปลูกเพื่อไม่ให้หน้าท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิออล-อะลูมิเนียม
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรครูปขาว 3. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา และกาญจนบุรี) จำนวน 595 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) จำนวน 3 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยให้ต้นอ้อยโตเต็มที่ก่อนตัดอ้อย อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง ปล่อยให้ต้นอ้อยโตเต็มที่ก่อนตัดอ้อย อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง ปล่อยให้ต้นอ้อยโตเต็มที่ก่อนตัดอ้อย อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรครูปขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงพาหะ เมื่อพบการระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และยะลา) จำนวน 301 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 506 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปักตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,266 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 443 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 256 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด พิไพโรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอามีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอามีทอกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 835 ไร่ การระบาดลดลง 62 ไร่	- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเอ็กซ์โทสะซอกซ์อัตรา 40 มล.
	5. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,973 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่	โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
	6. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส ยะลา และสงขลา) จำนวน 247 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่	- เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น
	7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 639 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่	- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือ ส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วย สารป้องกันกำจัดโรคพืช
	8. เพลี้ยหอยเกล็ด	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสงขลา) จำนวน 284 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ
	9. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 800 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 57 ไร่	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน โฟซาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
	10. โรคคราดำ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 117 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และ สารเหนียวที่แมลงปากดูดจับถาวรไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
	11. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 132 ไร่ การระบาดคงที่	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราสีชมพูให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และ ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำอื่นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
	12. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 53 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- ห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำ ระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป และสารฆ่าแมลงที่มี ประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน อัตรา 20 มล. โดยพ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน พ่น 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน ควรรดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง
	2. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 111 ไร่ การระบาดลดลง 11 ไร่	- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
	3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 11 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ในระยะที่ต้นเงาะแตกใบอ่อนถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกร พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
	4. โรคคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่	- โรคคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่น นำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 294 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่ มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. หนอนกินใบ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 246 ไร่ การระบาดคงที่	- เมื่อพบใบอ่อนมั่งคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน
	3. หนอนซอนใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 164 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วย สารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน
	4. โรคโน้ด	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 82 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคโน้ด ในช่วงที่มั่งคุดแตกใบอ่อน
	5. โรคโน้ดแทรคโนส	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 64 ไร่ การระบาดคงที่	เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 30-80 กรัม หรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร
	6. โรคโน้ดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 236 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคโน้ดแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดโรคโน้ดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคโน้ด เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 39 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วย สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน
	2. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 199 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบตาไซฟลูพรีน อัตรา 40-50 กรัม
	3. โรครุ่ยไม้กวาด	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 82 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรครุ่ยไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง
	4. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (น่าน พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 238 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 215 ไร่	- เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแต่ไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปีดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามคำแนะนำในฉลาก

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 29 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 172 จุด ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้