



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com
http:// www.moac.go.th



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 21 ตุลาคม 2567 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 เวลา 05.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้

วันที่ 21 ตุลาคม 2567


ภาคกลาง : จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด

ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 20 ต.ค. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 21 ต.ค. 2567



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.ศรีสำโรง	สุโขทัย	55.0	ฝนตกหนัก
2	อ.สามเงา	ตาก	49.4	ฝนตกหนัก
3	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	44.1	ฝนตกหนัก
4	อ.เมือง	นครนายก	40.6	ฝนตกหนัก
5	อ.เมือง	สมุทรปราการ	34.0	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

สรุปสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 - ปัจจุบัน รวมจำนวน 53 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ลำพูน นครพนม มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี นนทบุรี นครนายก ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้

จังหวัด	ยังคงมีสถานการณ์	แนวโน้ม
1. พิจิตร	สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง โพทะเล สากเหล็ก วังทรายพูน ทับคล้อ ดงเจริญ เมือง บางมูลนาก วชิรบำรุง ตะพานหิน	ระดับน้ำยังคงทรงตัว หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติภายใน 5 - 7 วัน
2. ลำพูน	เมือง	ระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน
3. นครพนม	ศรีสงคราม นาทม ท่าอุเทน นาหว้า เมือง บ้านแพง ธาตุพนม เรณูนคร	ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติภายใน 3 - 5 วัน
4. ยโสธร	เมือง ป่าดิว ไทยเจริญ เลิงนกทา	ระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติภายใน 3 - 5 วัน
5. สกลนคร	เมือง สวางคแดนดิน บ้านม่วง วาริชภูมิ เจริญศิลป์ คำตาก้า วานรนิวาส สองดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว นิคมน้ำอุ่น พังโคน กุดบาก	มีฝนตกในพื้นที่ ประกอบกับแม่โขงหนุนลำนํ้าสาขา ส่งผลให้ น้ำหลากไหลเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตร
6. หนองคาย	ศรีเชียงใหม่ รัตนวาปี โพธิ์ตาก โพนพิสัย	ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน
7. อุบลราชธานี	โขงเจียม เขมราฐ โพธิ์ไทร นาตาล	ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติภายใน 3 - 5 วัน
8. พระนครศรีอยุธยา	เสนา บางบาล ผักไห่ บางไทร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา	ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติภายใน 9 - 10 วัน
9. นครปฐม	บางเลน นครศรีชัย สามพราน กำแพงแสน	ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำล้นไหลเข้า บางพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน
10. สุพรรณบุรี	บางปลาม้า อู่ทอง สองพี่น้อง	มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ เนื่องจากมีการปล่อยน้ำบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่
11. อ่างทอง	โพธิ์ทอง แสวงหา ไชโย ป่าโมก	ระดับน้ำเพิ่มขึ้น น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

3. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 67)

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรารด นครนายก ปราจีนบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 99,659 ราย พื้นที่ 792,337 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 719,262 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 63,058 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 10,017 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,129.61 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,167 ราย พื้นที่ 10,445 ไร่ วงเงิน 16.23 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู อุบลราชธานี กาญจนบุรี ตรารด นครนายก ปราจีนบุรี ภูเก็ต และจังหวัดสตูล **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 6,220 ราย พื้นที่รวม 6,404 ไร่ กระชัง 6,690 ตอม. คิดเป็นเงิน 34.77 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,718 ราย พื้นที่ 2,157 ไร่ กระชัง 6,383 ตอม. วงเงิน 12.69 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น มหาสารคามหนองคาย อุบลราชธานี และจังหวัดตราด **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 704 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 75,139 ตัว แบ่งเป็น โค 348 ตัว กระบือ 40 ตัว สุกร 102 ตัว แพะ/แกะ 70 ตัว และสัตว์ปีก 74,579 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 146 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 32,857 ตัว วงเงิน 0.92 ล้านบาท

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 สนับสนุนกำลังพลและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือกำจัดดินโคลน รวมถึงล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเปิดเส้นทางเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าช่วยเหลือบ้านเรือนใน รวมทั้งสนับสนุน ถุงยังชีพ น้ำดื่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

4.2 สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 24,450 ชุด และถุงยังชีพ จำนวน 5,550 ชุด

4.3 กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 11 ต.ค. 67 ทั้งหมด จำนวน 1,202 หน่วย ในพื้นที่ 63 จังหวัด ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 960 เครื่อง (ปริมาณน้ำรวม 299.28 ล้าน ลบ.ม.) เครื่องผลักดันน้ำ 126 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 14 คัน (ปริมาณน้ำรวม 990,000 ลิตร) เครื่องจักรอื่นๆ 102 หน่วย

4.4 กรมส่งเสริมการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์พืชผัก เช่น ผักบุ้ง ค่ะน้า กวางตุ้ง ให้กับเกษตรกร 48,562 ราย 49,300 ซอง หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 7,560 ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 14,840 กิโลกรัม สำหรับฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด

4.5 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 808,261 ตัว ให้อาหารสัตว์พระราชทาน 999,120 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) 34,122 ซอง รักษาสัตว์ 7,583 ตัว ถุงยังชีพสัตว์ 371 ถุง พร้อมทั้งจัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว

4.6 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. - 7 ต.ค. 67 ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งสิ้น 44 ครั้ง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ พิชณุโลก น่าน ลำปาง สุโขทัย หนองคาย พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสตูล การให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 54 ชุด รถยนต์ 77 คัน เรือตรวจการประมง 66 ลำ โดยช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

4.7 การยางแห่งประเทศไทย ประสานงานกับผู้นำชุมชน/เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ รับแจ้ง และสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลสวนยางที่ประสบภัย (อุทกภัย) พร้อมแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการขอรับสวัสดิการตามมาตรา 49 (5)

4.8 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย เป็นการเฉพาะกิจในการบินสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ (ลำเลียงน้ำดื่มและอาหาร รวมทั้งลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน) ในการส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่น AS350B2 1 ลำ และรุ่น BELL407GXP 1 ลำ รวม 2 ลำ บินปฏิบัติการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเครื่องบินขนาดกลาง ชนิด CASA จำนวน 2 ลำ และเครื่องบินขนาดใหญ่ ชนิด CN235 จำนวน 1 ลำ รวม 3 ลำ บินปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจลำเลียงสิ่งของน้ำดื่ม และอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ 28 เที่ยวบิน 38:30 ชั่วโมงบิน

4.9 กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ พด.2/พด.6 เพื่อย่อยสลายวัสดุการเกษตรและบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง 17 จังหวัด ได้ให้การช่วยเหลือแล้ว จำนวน 148,598 ลิตร และระยะหลังน้ำลด มีการสนับสนุนปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงดินหลังน้ำลด

5. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 67)

5.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 62,301 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 38,357 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (59,478 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) มากกว่าปี 2566 จำนวน 2,823 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 328.91 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 111.33 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,060 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 58,132 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 34,594 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (55,098 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) มากกว่า ปี 2566 จำนวน 3,034 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 248.34 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 64.20 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,818 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม				รับได้อีก		
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.		ใช้การ	% ใช้การ
เหนือ	8	24,825	21,036	85	14,291	79	80	1,083	983	91	892	90	88	25,908	22,019	85	15,183	80	3,914
ตอน.	12	8,368	6,837	82	5,185	77	226	2,061	1,688	82	1,520	80	238	10,429	8,525	82	6,705	78	1,904
กลาง	3	1,419	1,092	77	1,032	76	27	419	333	80	308	78	30	1,838	1,425	78	1,340	76	413
ตะวันตก	2	26,605	22,516	85	9,239	69	8	164	63	39	52	34	10	26,769	22,579	84	9,291	69	4,190
ตะวันออก	6	1,515	1,258	83	1,163	82	52	1,006	782	78	726	76	58	2,520	2,040	81	1,889	80	481
ใต้	4	8,194	5,394	66	3,684	57	42	679	320	47	266	42	46	8,874	5,714	64	3,950	56	3,159
รวม	35	70,926	58,132	82	34,594	73	435	5,411	4,169	77	3,764	75	470	76,337	62,301	82	38,357	73	14,060

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 21,020 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,324 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 87.11 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 7.79 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 3,851 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	10,231	76	6,431	67	56.25	47.68	1.00	1.00	3,231
สิริกิติ์	9,141	96	6,291	94	15.99	23.53	5.00	4.96	369
ภูมิพล+สิริกิติ์	19,372	84	12,722	78	72.24	71.21	6.00	5.96	3,600
แควน้อยฯ	794	85	751	84	2.98	4.06	0.86	0.86	145
ป่าสักชลสิทธิ์	853	89	850	89	11.89	10.14	0.93	0.92	107
รวมทั้งหมด	21,020	85	14,324	79	87.11	85.41	7.79	7.75	3,851

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 18 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิติ์ (96%) อ่างฯ แม้งัดสมบูรณ์ชล (107%) อ่างฯ กิวลม (88%) อ่างฯ กิวคอกหมา (101%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (85%) อ่างฯ แม่มอก (103%) อ่างฯ ห้วยหลวง (94%) อ่างฯ น้ำอูน (91%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (90%) อ่างฯ ลำปาว (93%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (89%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (83%) อ่างฯ วชิราลงกรณ (89%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (95%) อ่างฯ บางพระ (85%) อ่างฯ หนองปลาไหล (89%) อ่างฯ ประแสร์ (100%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (94%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ ลำตะคอง (28%)

5.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำพระสทิ์ แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,577 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,573 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +21.69 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.01 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,300 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.51 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.27 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +12.10 ม.รทก. (เมื่อวาน +12.10 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 205 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 204 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 164 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 41 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 34 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 14 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 77 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 74 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 38 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 22 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 196 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 206 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) 10 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 50 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 81 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 44 ลบ.ม./วินาที
อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 941 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,033 ลบ.ม./วินาที)

5.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		15 ต.ค. 67	16 ต.ค. 67	17 ต.ค. 67	18 ต.ค. 67	19 ต.ค. 67	20 ต.ค. 67	21 ต.ค. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนทบุรี จ.นนทบุรี	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

5.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 21 ต.ค. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.07	-9.73
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	7.97	-8.03
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	4.96	-7.24
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	5.40	-6.60
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	5.20	-7.30
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	6.50	-8.00

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 18 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **ปัจจุบันยังจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 3 หน่วย** ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2567

- **ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง** มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ และจังหวัดลพบุรี ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (วังน้ำเขียว ทรัพย์เสด็จ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ปักธงชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์) นครสวรรค์ (ตากฟ้า ตาคลี พยุหะคีรี) และจังหวัดลพบุรี (โคกเจริญ บ้านหมี่ โคกสำโรง หอนงม่วง)

- **ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ** ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง (นครราชสีมา) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 3 อ่าง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 ตุลาคม 2567)

การปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 3,466 เที่ยวบิน (4,957:87 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 133.025 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร และปฏิบัติการโดย Ground Base Generator (GBG) จำนวน 19 ครั้ง พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ จำนวน 1,181 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 71 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท จันทบุรี และพังงา) จำนวน 3,018 ไร่ การระบาดลดลง 338 ไร่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร - กำจัดวัชพืชตามคันทนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของหนอนกระทู้กล้า ถ้ามีความจำเป็นในการใช้สารเคมีควรสารฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 20 มล. หรือเพนิโตรไทออน อัตรา 30 มล. เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟันเมื่อพบใบข้าวถูกทำลาย - หากสำรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว ป้องกันโดย ฟันเชื้อราบีเวอร์เรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว แต่หากสถานการณ์รุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง ควรใช้ในอัตราตามฉลากแนะนำ - หมั่นสำรวจแปลงข้าวอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ใช้สาร อีโทเฟนพรอกซ์ คาร์โบซัลแฟน ไอโซพอร์ทาบ ฟิโนบูคาร์บ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟัน ทุก 7 วัน - ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้ฟันทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซพอร์ทาโอเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สเตร์พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซิเตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟันตามอัตราที่ระบุในฉลาก - แนะนำเกษตรกรใช้แสงไฟล่อแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง - ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเริน บูโพเพนซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟันตามอัตราที่ระบุในฉลาก - ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม เนื่องจากเชื้อสาเหตุทำให้เกิดโรคเมล็ดด่าง
	2. หนอนกระทู้กล้า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ร้อยเอ็ด และสุรินทร์) จำนวน 326 ไร่ การระบาดลดลง 300 ไร่	
	3. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (ลำปาง อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม จันทบุรี อุบลราชธานี สกลนคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตรัง) จำนวน 6,254 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่	
	4. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย สุรินทร์ ตราด กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี) จำนวน 47,641 ไร่ การระบาดลดลง 15,726 ไร่	
	5. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และกาญจนบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	
	6. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุตรดิตถ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และสงขลา) จำนวน 55 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	
	7. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม เลย สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 50,485 ไร่ การระบาดลดลง 19,895 ไร่	
	8. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 50 ไร่ การระบาดลดลง 63 ไร่	
	9. โรคใบสีส้ม	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร นครราชสีมา และสุรินทร์) จำนวน 1,249 ไร่ การระบาดลดลง 68 ไร่	
	10. โรคใบขีดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร และอำนาจเจริญ) จำนวน 36 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	11. แมลงบัว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงราย และอุตรดิตถ์) จำนวน 380 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 332 ไร่	- กำจัดวัชพืชรอบแปลงนา ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบัว ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงใดๆ ในการป้องกันกำจัดแมลงบัว เนื่องจากไม่ได้ผลและยังทำลายศัตรูธรรมชาติ
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครพม นครราชสีมา สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 43,220 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 193 ไร่	- ปลอ่ยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอ่ยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมิมาเม็กดินเบนโซโทท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน
	2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,787 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 82 ไร่	- แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
	3. ไรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 340 ไร่ การระบาดลดลง 89 ไร่	- ป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง
	4. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,211 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และเก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที
	5. ดั้วงแรด	พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,186 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 551 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชลบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 733 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	2. ดั้วงแรด	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,250 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียมเพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน
	3. ดั้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 740 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน
	4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,812 ไร่ การระบาดลดลง 129 ไร่	- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
			- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ซ่อดอกที่ฝ่อ และทะเลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคทะลายน้ํา 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด ชุมพร นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 166 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 96 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 401 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- ตัดทางใบปาล์มน้ํามันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา 3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 4. โรคหน้ํายางแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,049 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (น่าน หนองคาย ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,829 ไร่ การระบาดลดลง 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย หนองคาย กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี พังงา ยะลา และสงขลา) จำนวน 131,496 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สกลนคร ชุมพร ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,723 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- คําแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ํายางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ํายางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. ไรแดงมันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สกลนคร จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 142 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ ชลบุรี และระยอง) จำนวน 829 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา และสกลนคร) จำนวน 1,401 ไร่ การระบาดลดลง 127 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 423 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 733,691 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10,144 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล. /น้ํ้า 20 ลิตร เชื้อไวรัส วอลโวอิโพลีโคโนไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระท่อม อัตรา 20-30 มล. /น้ํ้า 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรองแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ํ้าท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm) 2. โรคมึกเมา	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ สระแก้ว ยะลา จันทบุรี ชลบุรี และ จังหวัดสตูล) จำนวน 293 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ ลำพูน จำนวน 130 การระบาดคงที่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดของ ของโรค ให้ถอนต้นข้าวโพดที่แสดงลักษณะอาการไปเผาทำลาย นอกแปลงปลูกทันที และควรหมั่นกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง) จำนวน 465 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปักตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคแสดำ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และขอนแก่น) จำนวน 65 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 203 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ลพบุรี และสระแก้ว) จำนวน 595 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยให้ต้นอ้อยโตเต็มที่ก่อนตัด - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เมื่อพบ การระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย - เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการแสดำ ควรตัดแสดำออก ขณะเริ่มปรากฏอาการ ก่อนที่เชื้อหุ้มแสดำจะหลุดออก นำไปใส่ถุงไปทำลายนอกแปลงปลูก
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดง 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ชุมพร และจังหวัดกระบี่) จำนวน 761 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 295 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่) จำนวน 180 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 625 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (น่าน จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,930 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 412 ไร่ การระบาดลดลง 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 839 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สุราษฎร์ธานี และสงขลา) จำนวน 124 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 813 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร ผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟฟิกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซีอัตรา 40 มล. - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครยังคงระบาด พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาด รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	10. โรคราดำ 11. โรคราสีชมพู 12. หนอนเจาะผล 13. หนอนเจาะเมล็ด	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 147 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 140 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล) จำนวน 106 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- เมื่อพบคราบราสีดำนํ้าด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรครา คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ผสมนํ้าขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด - ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดนํ้าระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมป์ดา-ไซฮาโลทริน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 24 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 181 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 75 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบนํ้ามันเคี้ยว ผูกอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคราใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/นํ้า 20 ลิตร - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคราใบจุด 5. โรคราแอนแทรกโนส 6. โรคราใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 253 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 272 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 254 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 183 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 79 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง พังงา และนราธิวาส) จำนวน 356 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง - เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/นํ้า 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/นํ้า 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคราใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคราแอนแทรกโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมนํ้า 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคราใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรครา เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคราพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 69 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 208 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 90 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรีและน่าน) จำนวน 21 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน อัตรา 30 มล./นํ้า 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/นํ้า 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาไซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคราพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนํ้ามาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนํ้าไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมตักแต่ไปทำลายหากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมป์ดา-ไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมนํ้า 20 ลิตร

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ต.ค. 67)

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค 12 จุด ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชลบุรี พัทลุง และจังหวัดสงขลา มีพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 61 จุด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี ชลบุรี สุรินทร์ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ระยอง เลย ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา มหาสารคาม จันทบุรี สมุทรปราการ ตาก นครพนม นครราชสีมา มุกดาหาร นครนายก ชัยภูมิ และจังหวัดสงขลา

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2567 ทั้งหมด 9 จังหวัด 10 จุดได้แก่ จังหวัดชลบุรี นครนายก อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อุตรดิตถ์ พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้