




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
วันที่ 30 ตุลาคม 2567 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 11.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 07.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมีแนวพัดสอของลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้ตอนกลาง และอ่าวไทย ส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 29 ต.ค. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	68.5	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	52.6	ฝนตกหนัก
3	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	48.3	ฝนตกหนัก
4	อ.ตะกั่วป่า	พังงา	34.2	ฝนตกปานกลาง
5	อ.กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	31.8	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)  
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

สรุปสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 - ปัจจุบัน รวมจำนวน 53 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ลำพูน ยโสธร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ นครพนม นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี นนทบุรี นครนายก ระยอง กาญจนบุรีราชบุรี ตรีัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้

จังหวัด	ยังคงมีสถานการณ์	แนวโน้ม
1. พิจิตร	สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง โพทะเล วชิรบุรี	ระดับน้ำยังคงทรงตัว หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 5 - 7 วัน
2. ลำพูน	เมือง	ระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน
3. ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง	ระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 - 5 วัน
4. พระนครศรีอยุธยา	เสนา บางบาล ผักไห้ บางไทร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา	ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 9 - 10 วัน
5. นครปฐม	เมือง บางเลน นครชัยศรี กำแพงแสน	ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำล้นไหลเข้าบางพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน
6. สุพรรณบุรี	เมือง บางปลาม้า อู่ทอง สองพี่น้อง	มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่และไหลล้นเข้าพื้นที่การเกษตร
7. อ่างทอง	โพธิ์ทอง แสวงหา ไชโย ป่าโมก	ระดับน้ำเพิ่มขึ้น น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

### 3. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 67)

#### 3.1 ดินโคลนทับถม

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และจังหวัดเลย **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 411 ราย พื้นที่ 480 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 406 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 42 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 33 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.35 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 45 ราย พื้นที่ 21 ไร่ วงเงิน 122,503 บาท

**ด้านประมง และด้านปศุสัตว์** ไม่ได้รับผลกระทบ

#### 3.2 อุทกภัย

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 48 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวดี นครนายก ปราจีนบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง กระบี่ ตรัง สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 120,103 ราย พื้นที่ 932,147 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 834,606 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 86,453 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 11,088 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,334.69 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 5,502 ราย พื้นที่ 29,130 ไร่ วงเงิน 43.17 ล้านบาท

**ด้านประมง** ได้รับความเสียหาย 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี กาญจนบุรี ตรวดี นครนายก ปราจีนบุรี ภูเก็ต และจังหวัดสตูล **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,576 ราย พื้นที่รวม 7,410 ไร่ กระชัง 6,984 ตรม. คิดเป็นเงิน 39.59 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,884 ราย พื้นที่ 3,385 ไร่ กระชัง 6,543 ตรม. วงเงิน 20.56 ล้านบาท

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี และจังหวัดตรวดี **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,282 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 128,728 ตัว แบ่งเป็น โค 143 ตัว กระบือ 40 ตัว สุกร 638 ตัว แพะ/แกะ 45 ตัว และสัตว์ปีก 127,862 ตัว แปลงหญ้า 252 ไร่ **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 157 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 33,827 ตัว วงเงิน 1.02 ล้านบาท

#### 4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 25 ต.ค. 67 ทั้งหมด จำนวน 1,295 หน่วย ในพื้นที่ 66 จังหวัด ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 1,026 เครื่อง (ปริมาณน้ำรวม 264.99 ล้าน ลบ.ม.) เครื่องผลักดันน้ำ 144 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 14 คัน (ปริมาณน้ำรวม 996,000 ลิตร) เครื่องจักรอื่นๆ 111 หน่วย

4.2 กรมปศุสัตว์ ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 33 จังหวัด ได้แก่ อพยพสัตว์ 806,581 ตัว รักษาสัตว์ 7,583 ตัว ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 34,297 ซอง ฝูงยังชีพสัตว์ 371 ฝูง ให้อาหารสัตว์พระราชทาน 1,016,120 กิโลกรัม รวมทั้ง จัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ให้ด้วย

4.3 กรมประมง ดำเนินการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. - 7 ต.ค. 2567 ทั้งสิ้น 44 ครั้ง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 54 ชุด รถยนต์ 77 คัน เรือตรวจการประมง 66 ลำ โดยช่วยนำส่งเสบียงอาหารและน้ำดื่ม พร้อมทั้ง อพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

4.4 กรมฝนหลวงและการบิน ส่งเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ รุ่น AS 350 และ BELL 407 และเครื่องบิน CN 1 ลำ CASA 2 ลำ CN235 1 ลำ เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงถุงยังชีพ สิ่งของ อาหาร และเครื่องดื่ม ขึ้นเครื่องบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลำเลียงส่งต่อให้กับพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย 4.5 กรมส่งเสริมการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักเช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ให้กับเกษตรกร 48,562 ราย 49,300 ซอง และเตรียมหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 7,560 ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 14,840 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด

4.6 การยางแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการสนับสนุนหมอนยางพารา สำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ใบ (ใบละ 250 บาท) วงเงินรวม 250,000 บาท

4.7 กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ พด.2/พด.6 เพื่อย่อยสลายวัสดุการเกษตรและบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง 17 จังหวัด ได้ให้การช่วยเหลือแล้ว จำนวน 149,598 ลิตร และระยะหลังน้ำลด มีการสนับสนุนปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด. เพื่อฟื้นฟู และปรับปรุงดินหลังน้ำลด

4.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 136 ล้านบาท ให้กับสหกรณ์ จำนวน 39 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 4,348 ราย

#### 5. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 67)

##### 5.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 63,250 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 39,306 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (60,558 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) มากกว่าปี 2566 จำนวน 2,692 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 154.57 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 95.19 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,111 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 59,041 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,502 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (56,103 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79) มากกว่า ปี 2566 จำนวน 2,938 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 122.39 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 68.09 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 11,909 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รนภ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รนภ.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รนภ.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รนภ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนภ.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รนภ.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	21,552	87	14,807	82	80	1,083	998	92	907	91	88	25,908	22,550	87	15,714	82	3,381
ตอน	12	8,368	6,789	81	5,137	76	226	2,061	1,679	81	1,511	80	238	10,429	8,468	81	6,648	77	1,961
กลาง	3	1,419	1,261	89	1,201	88	27	419	334	80	309	79	30	1,838	1,595	87	1,510	86	243
ตะวันตก	2	26,605	22,761	86	9,484	71	8	164	70	43	59	38	10	26,769	22,831	85	9,542	71	3,938
ตะวันออก	6	1,515	1,279	84	1,185	83	52	1,006	801	80	745	78	58	2,520	2,080	83	1,930	81	440
ใต้	4	8,194	5,399	66	3,688	57	42	680	327	48	273	44	46	8,874	5,726	65	3,961	56	3,149
รวม	35	70,926	59,041	83	35,502	75	435	5,411	4,209	78	3,803	76	470	76,338	63,250	83	39,306	75	13,111

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 21,631 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 87 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 14,935 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 47.04 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 19.29 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 3,240 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	10,656	79	6,856	71	27.19	26.79	1.00	1.00	2,806
สิริกิติ์	9,205	97	6,355	95	10.40	10.37	7.00	6.98	305
ภูมิพล+สิริกิติ์	19,861	86	13,211	81	37.59	37.16	8.00	7.98	3,111
แควน้อยฯ	817	87	774	86	2.26	2.68	0.86	0.86	122
ป่าสักชลสิทธิ์	953	99	950	99	7.19	12.69	10.43	10.44	7
รวมทั้งหมด	21,631	87	14,935	82	47.04	52.53	19.29	19.28	3,240

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 18 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิติ์ (97%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (105%) อ่างฯ กิวลม (91%) อ่างฯ กิวคอกหมา (105%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (87%) อ่างฯ แม่มอก (101%) อ่างฯ ห้วยหลวง (92%) อ่างฯ น้ำอูน (88%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (89%) อ่างฯ ลำปาว (91%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (99%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (84%) อ่างฯ วชิราลงกรณ (89%) อ่างฯ ชุนด่านปราการชล (97%) อ่างฯ บางพระ (88%) อ่างฯ หนองปลาไหล (93%) อ่างฯ ประแสร์ (97%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (96%)

## 5.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,679 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,759 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +21.97 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.73 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,600 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,699 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.15 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.44 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +13.18 ม.รทก. (เมื่อวาน +13.52 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 229 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 233 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 179 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช ) 50 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 141 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 143 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 93 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 98 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลาปี) 30 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 28 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 209 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 232 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 12 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสี้ยว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสี้ยว 12 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 80 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 45 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,357 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,295 ลบ.ม./วินาที)

### 5.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		24 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	26 ต.ค. 67	27 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	29 ต.ค. 67	30 ต.ค. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแสด จ.ปทุมธานี	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.14	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

### 5.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 29 ต.ค. 67	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.86	-9.94
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	7.19	-8.81
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	4.18	-8.02
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	4.11	-7.89
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.17	-8.33
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	-	-

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

## 6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 18 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ พิชณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นท่อนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

**ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง** เนื่องจากจัดเก็บอุปกรณ์และปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

**สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 21 ตุลาคม 2567)**

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 230 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97.83 จำนวน 3,473 เที่ยวบิน (5,259:47 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 133.025 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร และปฏิบัติการโดย Ground Base Generator (GBG) จำนวน 19 ครั้ง พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์จำนวน 1,181 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 71 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

## 7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. หนอนกระทู้กล้า 3. หนอนทอใบข้าว 4. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 5. โรคขอบใบแห้ง 6. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 7. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 8. โรคใบสีส้ม 9. โรคใบขีดสีน้ำตาล 10. แมลงบั่ว 11. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท จันทบุรี และพังงา) จำนวน 1,451 ไร่ การระบาดลดลง 1,568 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด และ สุรินทร์) จำนวน 1,126 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 800 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ลำปาง อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตรัง) จำนวน 6,164 ไร่ การระบาดลดลง 90 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย สุรินทร์ ตราด กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี) จำนวน 38,679 ไร่ การระบาดลดลง 8,962 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (อุดรดิตถ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ชัยนาท และสงขลา) จำนวน 76 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 21 ไร่ พื้นที่ระบาด 30 จังหวัด (กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม เลย สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 35,178 ไร่ การระบาดลดลง 15,307 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 50 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร นครราชสีมา และสุรินทร์) จำนวน 1,251 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา มหาสารคาม และสกลนคร) จำนวน 35 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และอุดรดิตถ์) จำนวน 380 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และกาญจนบุรี) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร - กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของหนอนกระทู้กล้า ถ้ามีความจำเป็นในการใช้ สารเคมีควรสาดฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาโทออน อัตรา 20 มล. หรือเพนีโทรโทออน อัตรา 30 มล. เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟันเมื่อพบใบข้าวถูกทำลาย - หากสำรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว ป้องกันโดย ฟันเชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว แต่หากสถานการณ์รุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง ควรใช้อัตราตามฉลากแนะนำ - เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ใช้สาร อีโทเฟนพรอกซ์ คาร์โบซัลแฟน ไอโซไพเรคาร์บ ฟิโนบูคาร์บ โดยเลือกใช้ สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟัน ทุก 7 วัน - ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้ฟัน ทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซไพเรโทเลน คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ สเตร์พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟันตามอัตราที่ระบุในฉลาก - แนะนำเกษตรกรใช้แสงไฟล่อแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง - ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาทะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟนิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฟันตามอัตราที่ระบุในฉลาก - ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกัน กำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม เนื่องจากเชื้อสาเหตุทำให้เกิดโรคเมล็ดด่าง - กำจัดวัชพืชรอบแปลงนา ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าว เพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว - หมั่นสำรวจแปลงข้าวอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาโทออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 43,372 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 152 ไร่	- ปลอ่ยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอ่ยแตนเบียน ไข่ทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซโท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน - แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงค้ำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงค้ำหนามมะพร้าว - ป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้ สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารผสมน้ำ 20 ลิตร ฟันทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	<p>2. แมลงดำหนาม</p> <p>3. โรสสีขามะพร้าว</p> <p>4. ดั้วงวง</p> <p>5. ดั้วงแรด</p>	<p>พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,707 ไร่ การระบาดลดลง 80 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 348 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,208 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,121 ไร่ การระบาดลดลง 65 ไร่</p>	<p>- ดัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และเก็บเศษซากพืชนำไปเผาออกแปลงทันที</p> <p>- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับดั้วงวงและดั้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม เพื่อกำจัดดั้วงแรดในระยะดักด้</p>
ปาล์ม น้ำมัน	<p>1. หนอนปลอกเล็ก</p> <p>2. ดั้วงแรด</p> <p>3. ดั้วงกุหลาบ</p> <p>4. โรคลำต้นเน่า</p> <p>5. โรคทะลายเน่า</p> <p>6. โรคใบจุด</p> <p>7. โรคใบจุดสาหร่าย</p>	<p>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชลบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 679 ไร่ การระบาดลดลง 54 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,167 ไร่ การระบาดลดลง 83 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 697 ไร่ การระบาดลดลง 43 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,694 ไร่ การระบาดลดลง 118 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด ชุมพร นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 150 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่</p> <p>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 96 ไร่ การระบาดคงที่</p> <p>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 397 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่</p>	<p>- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน</p> <p>- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับดั้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามเมตตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน</p> <p>- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน</p> <p>- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด</p> <p>- ดัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ซ่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง</p> <p>- ดัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ</p>

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ยางพารา	1. โรครากขาว  2. โรคใบร่วงยางพารา  3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา  4. โรคหน้ำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,030 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่  พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (หนองคาย ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,880 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 51 ไร่  พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย หนองคาย กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี พังงา ยะลา และสงขลา) จำนวน 131,496 ไร่ การระบาดคงที่  พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สกลนคร ชุมพร ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,723 ไร่ การระบาดคงที่	- คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรครากขาวกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น  - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา  - รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ  - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ
กาแฟ	1. โรคราสนิม  2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่  พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง  2. โรแดงมันสำปะหลัง  3. โรคโคนเน่าหัวเน่า  4. โรคพุ่มแจ้  5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สกลนคร จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 137 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่  พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ ชลบุรี และระยอง) จำนวน 99 ไร่ การระบาดลดลง 730 ไร่  พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา และสกลนคร) จำนวน 1,401 ไร่ การระบาดคงที่  พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 385 ไร่ การระบาดลดลง 38 ไร่  พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 804,792 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 71,101 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง  - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน  - ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล. /น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วอลโวโพลีโธโรไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระท่อม อัตรา 20-30 มล. /น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน  - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ  - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ  - ควรกรองแปลงปลูกเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระพี้ข้าวโพด ลายจุด (fall amywom)	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ สระแก้ว ยะลา จันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดสตูล) จำนวน 226 ไร่ การระบาดลดลง 67 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระพี้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง) จำนวน 450 ไร่ การระบาดลดลง 15 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป็นต่อเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และขอนแก่น) จำนวน 65 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยให้ต้นอ้อยโตเต็มที่ก่อนตัดอ้อย ตัดอ้อยแล้วปล่อยให้ต้นอ้อยตายตามธรรมชาติ



ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรควิวขาว 3. โรควัฒ์ดำ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และมหาสารคาม) จำนวน 268 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 65 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ลพบุรี และสระแก้ว) จำนวน 595 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรควิวขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เมื่อพบการระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย - เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการแฉ่ำดำ ควรตัดแฉ่ำดำออก ขณะเริ่มปรากฏอาการ ก่อนที่เหี่ยวหุ้มแฉ่ำดำจะหลุดออก นำใส่ถุงไปทำลายนอกแปลงปลูก
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. หนอนเจาะผล 5. ไรแดง 6. โรครากรเน่าโคนเน่า 7. โรควิดหรือใบไหม้ 8. โรควิวจุดสาหร่าย 9. เพลี้ยหอยเกล็ด 10. เพลี้ยจักจั่นฝอย 11. โรคคราดำ 12. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ชุมพร และจังหวัดกระบี่) จำนวน 770 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 278 ไร่ การระบาดลดลง 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่) จำนวน 182 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 623 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (น่าน จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,772 ไร่ การระบาดลดลง 158 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 410 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 852 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 13 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสงขลา) จำนวน 172 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 49 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 813 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 97 ไร่ การระบาดลดลง 50 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอามีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอามีทอกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเอ็กซ์โทอะซอกซ์อัตรา 40 มล. - โรครากรเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรควิดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรควิวจุดสาหร่ายให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรควิวยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และสารเหนียวที่แมลงปากดูดซับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคคราดำที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำขุ่นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	13. หนอนเจาะเมล็ด	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล) จำนวน 106 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัด ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 24 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 188 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 81 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคราใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกร พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่น นำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคราใบจุด 5. โรคราแอนแทรกโนส 6. โรคราใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 251 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 284 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 266 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และ นครศรีธรรมราช) จำนวน 185 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร) จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดลดลง 39 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง พังงา และนราธิวาส) จำนวน 358 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u>	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่ มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง - เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วย สารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการ ระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคราใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคราแอนแทรกโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคราใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกัน กำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคราพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และ สมุทรสาคร) จำนวน 71 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และ จันทบุรี) จำนวน 212 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 88 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และน่าน) จำนวน 23 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่</u>	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วย สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพเรทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออก ซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบตาไซฟลูทริน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคราพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือ นำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแต่ไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมบ์ดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร

## 8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 67)

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค 15 จุด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ชลบุรี ปราจันบุรี บุรีรัมย์ พัทลุง ระยอง สมุทรปราการ อุบลราชธานี ตาก มีพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 83 จุด ประกอบด้วย อุบลราชธานี สงขลา ชลบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ระยอง ศรีสะเกษ เลย ปราจันบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครนายก มหาสารคาม จันทบุรี สมุทรปราการ พัทลุง เชียงราย ตาก มุกดาหาร สมุทรสงคราม ชัยภูมิ พิจิตร ยโสธร สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ และพบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดปราจันบุรี เป็นสุนัขไม่ทราบข้อมูลเจ้าของและไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน 1 ตัว

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2567 ทั้งหมด 7 จังหวัด 9 จุด คือ จังหวัดปราจันบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ บุรีรัมย์ พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้