



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1010

วันที่ 18 กันยายน 2567

เวลา 10.04 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๒๐-๓๕๐๐

โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๓๕๐๑ Email : oard3@yahoo.com

ที่ กษ.๐๘๙๙๙/๑๖๙๓๗

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น)

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำข้อมูล “เตือนภัยการเกษตร” โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่าง ๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตั้งนั้น สวพ. ๓ จึงขอสงข้อมูลดังกล่าว มาเพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิรันนวชัย วิทยารณกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

เดือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ 18 กันยายน – 1 ตุลาคม 2567

สภาพแวดล้อม/สภาพอากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ	ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่	1. มะเขือเปราะ	ระยะเจริญเติบโต	หนอนเจาผลมะเขือ	ทำความสะอาดให้แก่ยอดมะเขือ ในระยะต้นมะเขือกำลังเจริญเติบโต จะพบว่ายอดเหี่ยงหันซัดเวลาเดดจัด เพราะห่อน้ำห่ออาหารของพืชถูกทำลาย และเมื่อตรวจสอบจะพบว่าจะประมาณไม่เกิน 10 เซนติเมตร จากปลายยอดหนอนจะกัดกินภายใน ทำให้ยอดที่แข็งแรงถูกทำลาย ยอดใหม่ที่แตกมามีขนาดเล็กกว่า และผลมะเขือที่เกิดมายังได้รับความเสียหายโดยหนอนจะกินทำให้เสียคุณภาพส่งขายไม่ได้ในช่วง bardurun และอาจถูกทำลายถึง 50 เปอร์เซ็นต์	1. วิธีกล กีบยอดและผลที่ถูกทำลายทั้งที่มีหนอนและไม่มีหนอน จะช่วยลดการระบาด 2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น สไปน็อกแรม 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมามกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แบต้า-ไซฟลูทริน 2.5% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
	2. พืชตระกูลกะหลា และผักกาด (เช่น คะน้า กะหลាปลี กะหลาดออก บรอกโคลี กวางตุ้ง)	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	หนอนไยผัก	ตัวเต็มวัยเพศเมียร่างไข่เป็นพองเดี่ยว ๆ หรือกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งบนใบและใต้ใบพืช หนอนมีลักษณะเรียวยาว หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก เมื่อถูกตัวจะดันอย่างแรง และสร้างไขพادตัวขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ หนอนจะกัดกินผิวใบทำให้ผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแท้จากนั้นเข้าตักเดัด	1. การใช้กับดักชนิดต่าง ๆ - กับดักการเหนี่ยวสีเหลือง เป็นกับดักทรงกระบอก หรือรูปป่องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทำด้วยการเหนี่ยวทุก 7 - 10 วันครั้ง สามารถจับผึ้งเสือหนอนไยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก โดยจับผึ้งเสือเพศเมีย : เพศผู้ ได้ 0.79 : 1 และเมื่อติดตั้งกับดักการเหนี่ยวสีเหลือง

สภากาแฟแนวต่ออม/สภากาฟ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่ออก เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัจจัยที่ควรระวัง	ข้อสังเกตถักหินด้วย/ อาการท้ออ่อน	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
	ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ)		บริเวณใบพืช โดยมีใบบาง ๆ ปกคลุมติดใบพืช	จำนวน 80 ก้าบตักต่อไร่ สามารถลดครึ่งไปได้ สารเคมีแมลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ - ก้าบตักและสา房子 หลอดสีน้ำเงิน 20 วัตต์ เป็น [*] หลอดเรืองแสงที่เหมาะสมสมใน การใช้ปั๊บสีเสือ หมอนไนย์ก็สามารถที่สุด มีรากกาquia กว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ และปล่อยด้วยปั๊บสี [*] อันตรายจากแสงอุตสาหกรรม เนื่องจากติดตั้ง กับตักแสงไฟควรติดตั้งตรง ขอบอกและผิงผัก และควรดำเนินการติดตั้งพื้นที่ที่ 2. การใช้กระรีอันดาษท่ายในล่อน หรือการ ปลูกผักกาด Murray โดยการปลูกผักในโรงเรือนที่ คุณตัวยาตามข่ายในล่อนขนาด 16 mesh (256 ช่องต่อตารางนิ้ว) สามารถป้องกันการเข้า ทำลายของหนอนในผักและหนอนผีเสื้อใน ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องนี้จะเรียบง่าย ในล่อนต้องปิดด้วยมีดซิลิโคนตัวเดียว ป้องกันผีเสื้อลงมาเมี้ยดลดครั้งเดียวไป lange 3. การใช้สารเคมีภัย [*] - การใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลิส ทูริงเนียนธิส	

สกุลแบตเตอร์เชลล์/สกุล อาการที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา	เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัจจัยที่ควรระวัง	ข้อสังเกตถ้าจะมี/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อาการที่เกิดในช่วงเวลาดี	เกิดผลกระทบ	ช่วงพืชเข้าวัย	เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้		ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดดูดน้ำผัก แต่เมื่อจะมาสกัดเพลี้ยแล้วก็มีปัจจัยสำคัญที่ มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของยาเรียกทำให้ หนอนไข่ผักลดตาย จึงมีการผลิตเชื้อบะบัดที่เรียก ในรูปการค้าออกจำหน่ายที่สำคัญ 2 สายพันธุ์ คือ <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> และ <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> อัตรา 100 - 200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ปัจจุบันใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลาง ในช่วงที่ มีการระบาดมากพิจารณาการใช้จอยต่อสรุป และ ช่วงเวลาพนักใหญ่ หรือพืชสนับสนุนสำราญแล้ว 4. การใช้รังสีทาง杏光 tract กรรมสามารถช่วยลดการ ระบาดของหนอนไข่ผักได้ เช่น การไฟฟ้าร้อนดิน ตากเดด หรือการทำลายสาขាផืชชอาหาร หรือ การปลูกพืชหมุนเวียน ทั้งนี้เพื่อจัดการ ขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของหนอนไข่ผัก 5. การใช้สารฆ่าแมลง เนื่องจากหนอนไข่ผัก เป็นแมลงที่สามารถสร้างความต้านทานต่อ สารฆ่าแมลงได้รวดเร็ว และหลายชนิด การ พิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ	

สภาวะแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระบะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตหลักของแมลง/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	เกิดผลกระทบ	เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้		เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันกำจัด หนอนฝีผ้าไม้ให้เข้าทำลายผลผลิตได้เกิด ^{ความเสียหายได้ สารเคมีเหล่านี้มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดหนอนฝีผ้า เช่น สบปนไฮโดรเม 12% SC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟินเพอร์ 10% SC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โลกลฟ์เพรด 16% EC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อินดอกซ์คาร์บ 15% EC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินบิโน๊ต 1.92% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พีพรนิล 5% SC อัตรา 60 - 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (เพิ่มเมื่อพบร่องรอยหนอนในยอดพัก 5 วัน ติดต่อ กัน 2 ครั้ง ควรลดปริมาณการออกฤทธิ์ ทุก 14 วัน)}	เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันกำจัด หนอนฝีผ้าไม้ให้เข้าทำลายผลผลิตได้เกิด ^{ความเสียหายได้ สารเคมีเหล่านี้มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดหนอนฝีผ้า เช่น สบปนไฮโดรเม 12% SC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟินเพอร์ 10% SC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โลกลฟ์เพรด 16% EC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อินดอกซ์คาร์บ 15% EC อัตรา 40 - 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินบิโน๊ต 1.92% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พีพรนิล 5% SC อัตรา 60 - 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (เพิ่มเมื่อพบร่องรอยหนอนในยอดพัก 5 วัน ติดต่อ กัน 2 ครั้ง ควรลดปริมาณการออกฤทธิ์ ทุก 14 วัน)}
3. พืช	พุกระยะ การเจริญเติบโต	1. โรคใบบุดดาภ (เชื้อรา <i>Cercospora capsici</i>)	อาการของโรคมักพบในท่อระบายน ต้านทานของต้นก่อน แล้วขยายตัวตามใบยัง ^{ใบที่อยู่ด้านบน อาการรุนแรงพบบุดดาลีกา ๑ สี น้ำตาลค่อนข้างกลม ต่อมมาແຄลขยายใหญ่ขึ้น}	1. จัดระบบปุ๋ยพิริกให้เหมาะสม ไม่ควรปุ๋ย ปัจจัยกินไป เพื่อลดความชื้นในพืช 2. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อให้อากาศ ถ่ายเทสะดวก เป็นการลดความชื้น ทำให้	

สกการแผลต้ออม/สภาก อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่օอาจ เกิดผลสาระทบท พืชในช่วงนี้	ระบยการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	วิธีดูแลรักษาและ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
สกการแผลต้ออม/สภาก อากาศที่เกิดในช่วงเวลา			กลากและล้มลุกหัวหรือสีขาวอ่อนๆ ขอบแผลตื้น น้ำตาลเทม บางครั้งพับแผลเป็นเส้นสีเขียวหรือสีเหลืองรอบ ต้นกระดูกรุนแรง จะเกิดแผลเจ็บมาก และขยายพารือความติดกันเป็นแผลใหญ่ ไปเหลือง หลุดร่วงก่อนกำหนด ต้นจะโกรลง บะหักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง น่องจากน่องอาจพบอาการของโรคได้บันทึก และกำกับดูแล	กลากและล้มลุกหัวหรือสีขาวอ่อนๆ ขอบแผลตื้น น้ำตาลเทม บางครั้งพับแผลเป็นเส้นสีเขียวหรือสีเหลืองรอบ ต้นกระดูกรุนแรง จะเกิดแผลเจ็บมาก และขยายพารือความติดกันเป็นแผลใหญ่ ไปเหลือง หลุดร่วงก่อนกำหนด ต้นจะโกรลง บะหักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง น่องจากน่องอาจพบอาการของโรคได้บันทึก และกำกับดูแล	สกการแผลต้ออมไม่เหมือนสกการแผลต้ออมของโรค 3. หลักเลี้ยงการให้น้ำช่วงเวลาเย็น 4. หมั่นตรวจสอบปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบ อาการของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรค และเก็บใบไป ที่ร่วงทั่วไปทำลาย หรือผู้ดินน้ำออกแปลงปลูก ไม่ใช่ไวนิบริเวณหรือข้างแปลง เพื่อตัดปริมาณ เชื้อสาเหตุโรค และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัด โรคพืช แมมน้ำเชง 80% WP อัตรา 40 – 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เป็นนิล 50% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 - 7 วัน
			โรคแผลน้ำตื้นที่เริ่มสุก หรือก่อนที่ ผลพิรภัจเบคี่ยนสี อาการเริ่มแรกเป็นจุด ที่ร่องรอยต่างๆ บดทึบกันอยู่ ต่อมมาแผลขยายใหญ่ ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณแผลพบ ส่วนของซื้อร้าเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กเรียบเป็นวง ซึ่องกัน ในส่วนพื้นที่อาจเป็นสีเขียวหรือสีเขียวเข้ม หรือส้มอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มโปรตุซูลชีวารถเสียหาย ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลเสีย ผลพิรภัจเบเป็น โรคคืบจะเกิดงอกอีกต่อไป ผลลัพธ์คือรากแห้ง [*] และการรักษา	โรคแผลน้ำตื้นที่เริ่มสุก หรือก่อนที่ ผลพิรภัจเบคี่ยนสี อาการเริ่มแรกเป็นจุด ที่ร่องรอยต่างๆ บดทึบกันอยู่ ต่อมมาแผลขยายใหญ่ ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณแผลพบ ส่วนของซื้อร้าเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กเรียบเป็นวง ซึ่องกัน ในส่วนพื้นที่อาจเป็นสีเขียวหรือสีเขียวเข้ม [*] หรือส้มอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มโปรตุซูลชีวารถเสียหาย ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลเสีย ผลพิรภัจเบเป็น โรคคืบจะเกิดงอกอีกต่อไป ผลลัพธ์คือรากแห้ง [*] และการรักษา	1. เลือกชื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ ปราศจากโรค หรือถ้าเก็บแบบตัดพันธุ์ของ ต้อง [*] เลือกจากผู้ที่ไม่เป็นโรค 2. ควรระบุเมล็ดพันธุ์น้ำอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส นาน 20 - 25 นาที ก่อนพาะ 3. จัดตระกะปลูกพืชให้เหมาะสม ไม่ปลูกชื้นๆ เกินไป และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้ แพร่กระจายเชื้อโรค เช่นปืนสารพาราฟิลด์มาส์ ต่อการเกิดโรค 4. หมั่นตรวจสอบปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อ

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>พบร่องรอยเป็นโรค เก็บนำไปทำลายนอก แปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค แล้ว พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพรคลอร่าซ 50% WP อัตรา 20 - 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 - 7 วัน</p> <p>5. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคราธราบ ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรค</p>
4. ขิง	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	โรคเหี่ยวยหรือแห้งเน่า (เชื้อแบคทีเรีย <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i>)		<p>อาการเริ่มแรก ใบแสดงอาการมวนห่อ สีของใบเขิด ต่อมมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้น มีอาการฉาน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากแห้งได้ง่าย¹ และหักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น หากตรวจดูที่ ลำต้นจะพบส่วนของห่อลำเลียงน้ำและอาหาร มีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อนำต้นมาตัดตามยาวจะ² ในน้ำสะอาดประมาณ 5 - 10 นาที จะเห็น ของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> การเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาด ของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี ไพรวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไวนานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลง ได้มาก พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค สามารถ ฆ่าเชื้อโรคในดิน โดยใช้ยาระเบิดปุ๋ย อัตรา 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ หัวนอนในแปลง หลังไพรวนดินครั้งแรก จากนั้นไถกลบและ

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>รณ์น้ำให้ดินมีความชื้น ทึ่งไว้ 3 - 4 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช</p> <p>4. ใช้วัตพัณุปลดโรค</p> <p>5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที และโรยปุ๋นขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค</p> <p>6. ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นำส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก</p> <p>7. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืชตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ให้สลับปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช้พืชอาศัย เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เพื่อตัดวงจรของโรค</p>
5. กระชาย	ทุกรายละเอียดที่ การเจริญเติบโต	โรคเที่ยวหรือเหง้าแห้ง ^(เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum)	อาการเริ่มแรก ใบแสดงอาการมัวหม่นห่อ สีของใบเสิดตัวมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้น มีอาการฉาน้ำ ลำต้นแห้งลุดอกจากเหง้าได้ง่าย และหักพับ แต่ไม่มีเมล็ดเหมือน หากตรวจสอบที่	อาการเริ่มแรก ใบแสดงอาการมัวหม่นห่อ สีของใบเสิดตัวมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้น มีอาการฉาน้ำ ลำต้นแห้งลุดอกจากเหง้าได้ง่าย และหักพับ แต่ไม่มีเมล็ดเหมือน หากตรวจสอบที่	<p>1. ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคมาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี</p> <p>2. ไกพรวนดินให้สักเกินกว่า 20 เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไวนานกว่า 2 สัปดาห์</p>

สภากาแฟและเครื่องดื่ม/สภากาแฟที่เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง	ชนิดพืชที่օadget เกตเผกกรอบ	ระบบการเจริญเติบโตของพืชในช่วงหนึ่ง	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตหลักๆ ของมนุษย์/อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
			ลำต้นจะพัฒนาข่องหอกลำตัวเสี้ยนและขยายตัว มีเส้นทางสารซึ่ง เมื่อหนานั้นสามารถขยายตัวของตัวเอง ในช่วงเวลาเดียวสามารถ 5 - 10 นาที จะเห็น ขอแหลกเสี้ยวขาคั้นภายในไม่หล่อออกมานะ	จะช่วยลดปริมาณเชื้อสารที่อยู่ในอาหารต่อไปได้มาก 3. พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค สามารถ นำเชื้อโรคในดิน โดยใช้รูดผึ่งตามบุ่นขาว อัตรา 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ หวานลงในแม่น้ำ หลังจากนั้นคั้นรังและจากนั้นนำไปคลับและ รดนำไปให้คนเม็ดความซึ่น ทั้งวัน 3 - 4 สเปด้า จึง เริ่มปฏิภาค	จะช่วยลดปริมาณเชื้อสารที่อยู่ในอาหารต่อไปได้มาก 3. พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค ให้บุ่นที่เป็นโรค พับตันที่แสดงอาการของโรค ให้บุ่นที่เป็นโรค นำไปทำลายหมอกแปลงปลูกกันต่อ และนำไปขาย บริโภคหมุนเวียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค 6. แนะนำให้มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยว ผลผลิตแล้ว นำส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรค ไปทำลายหมอกแปลงปลูก 7. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูก พืช十字花科 เชื้อสารที่อยู่ในอาหาร เช่น พืช十字花科 เชิง พืช十字花科 มีมันผู้รับ พริก และถั่วตีสัง ^{ให้สับปดปลูกพืช十字花科นี้ในช่วงที่ไม่ใช่พืช十字花科 เช่น}

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เพื่อตัดวงจรของโรค
6. พืชตระกูลส้ม ^(เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และ ส้มเขียวหวาน)	แทรกยอดอ่อน	หนอนชอนใบส้ม	ผีเสื้อตัวเต็มวัย วางไข่ได้เนื้อเยื่อใบใกล้เส้น กลางใบ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินและ ชอนไขอยู่ในระหว่างผิวใบ หนอนจะทำลาย ด้านใต้ใบมากกว่าบนใบ รอยทำลายสังเกตได้ง่าย ตั้งแต่เริ่มทำลายโดยเห็นเป็นเส้นทางสีขาว เรียวยาวในระยะเริ่มแรกและขยายใหญ่ขึ้น เป็นทางคดเคี้ยวไปมา ในมีลักษณะบิดองลง ทางด้านที่มีหนอนทำลาย นอกจากทำลายใบแล้ว ถ้ามีการระบาดมากหนอนจะเข้าทำลายกิ่งอ่อน และผลอ่อนด้วย รอยแพลที่เกิดจากการทำลาย จะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรีย <i>Xanthomonas</i> <i>citri</i> subsp <i>citri</i> ซึ่งทำให้เกิดโรคแคงเกอร์ รุนแรงขึ้น	1. การบังคับยอดให้แตกพร้อมกัน สามารถ ควบคุมประชากรของหนอนชอนใบส้มได้ดีขึ้น สะดวกในการดูแลรักษา ช่วยลดจำนวนครั้ง ในการใช้สารเคมีในการแทรกยอดแต่ละรุน และเป็นการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 2. ใบอ่อนที่พบหนอนชอนใบส้มลงทำลายมาก ควรเก็บทำลายทิ้ง เพื่อลดปริมาณหนอนชอนใบส้ม ในการแทรกยอดรุนต่อไป 3. สำรวจหนอนชอนใบส้มช่วงแตกใบอ่อน โดยสุ่มสำรวจแปลงละ 10 ต้น ต้นละ 5 ยอด หากยอดอ่อนถูกทำลายเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของยอดที่สุ่มสำรวจทั้งหมด ให้พ่นสารฆ่าแมลง เช่น ออมิตาโคลพрид 70% WG อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเพนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรฟิโนฟอส 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไบเฟนทริน 2.5% EC	

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะบาเมกติน 1.8% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ปีโตรเลียม ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคล์ไทอนนิติน 16% SG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทด์มีทอกแซม 25% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งหลังใบและ หน้าใบ และถ้าสำรวจพบว่ามีการระบาด ของหนอนชอนใบส้มให้พ่นซ้ำ</p> <p>**** การใช้ปีโตรเลียมออยล์ ในการป้องกัน กำจัดหนอนชอนใบส้มให้มีประสิทธิภาพดีนั้น ต้องทำการพ่นสารโดยใช้อัตราなるมากกว่าการ พ่นสารฆ่าแมลงทั่วไป เพื่อให้สารน้ำมัน เคลือบใบพืช</p>
7. มะพร้าว	มะพร้าวที่ยังไม่ได้ ผลผลิตและ มะพร้าวที่ได้ ผลผลิตแล้ว	1. ด้วงแรด	ตัวเต็มวัยเข้าทำลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัด เจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ทำให้ ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแห่งเป็นริ้ว ๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้าโดนทำลายมาก ๆ	1. วิธีเขตกรรม ทำความสะอาดบริเวณสวน มะพร้าวเพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ เป็นวิธีที่ ใช้ได้ผลดีมานาน ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองใหญ่ กองขี้เลือย แกลบ ควรกำจัดออกไป จากบริเวณสวน หรือกองให้เป็นที่ แล้วหมั่นกลับ	

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				<p>จะทำให้ใบที่เกิดใหม่เคราะแกร์น รอยแพลงที่ถูกด้วงแรมมะพร้าว กัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามารavage ไป หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในที่สุด ด้วงแรมมะพร้าวในระยะตัวหนอน ส่วนใหญ่พบรตามพื้นดินในบริเวณที่มีการกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะกัดกินและทำลายระบบ呼吸ของมะพร้าว ปลูกใหม่ ทำให้พบอาการยอดเหี่ยวยและแห้ง เป็นสีน้ำตาล ต้นเคราะแกร์นไม่เจริญเติบโต เป็นสีน้ำตาล ต้นเคราะแกร์นไม่เจริญเติบโต</p>	<p>เพื่อตรวจสอบ หากพบหนอนให้จับมาทำลาย หรือเ放กของขยายตัวนั้นเสีย ส่วนของลำต้นและตอมมะพร้าวที่โคนทึบไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตาย ควรโค่นลงมาเผาทำลาย ต้นมะพร้าวที่ถูกตัด เพื่อป้องกันเชื้อโรค ถ้ายังสอดอยู่เผาทำลายไม่ได้ ควรถอนออกเป็นท่อนสั้น ๆ นำมารวมกันไว้ ปล่อยให้ผุสลาย ล่อให้ด้วงแรมมาวางไข่ ด้วงแรมจะวางไข่ตามเปลือกมะพร้าวที่อยู่ติดกับพื้นดิน เพราะมีความชุ่มชื้นสูงและผุเร็ว เผาทำลายท่อนมะพร้าวเพื่อกำจัดทั้งไข่ หนอน และตักเดือดของด้วงแรมมะพร้าว ตอมมะพร้าว ที่เหลือให้ใช้น้ำมันเครื่องใช้แล้วราดให้ทั่วๆ เพื่อป้องกันการวางไข่ได้</p> <p>2. การใช้ชีววิธี ใช้เชื้อรากเขียวเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium sp.</i>) ใส่ไว้ตามกองขยาย กองปุ๋ยคอก หรือท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรมมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชือให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุด ลดน้ำให้ความชื้น หายสุด เช่น ใบมะพร้าว คลุมกองไว้ เพื่อรักษาความชื้นและป้องกัน</p>

สกุลแมลงตัวอ่อน/สกุลแมลงที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกัน	ชนิดพืชที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบ	ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	วิธีดูแลดักจับแมลง/อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อาการที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกัน	ไม่มีพืชที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบ	เจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้	อาการที่อาจพบ	แสดงผล เศียรจะทำลายตัวและลดลงพืชราก	ระบบการเจริญเติบโต 3. การใช้สารเคมี
อาการที่อาจพบ	ไม่มีพืชที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบ	ไม่มีพืชที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบ	ไม่มีพืชที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบ	แสดงผล เศียรจะทำลายตัวและลดลงพืชราก 3.1 ต้นมะพร้าวอายุ 3 - 5 ปี ที่ยังไม่สร้างรากใหม่ ใช้คุกழิเน็นสับรีบผลก่อนพืชรากต้นหางไปบรรบบฯ ยอดอ่อน ทางลง 2 ถุงตันละ 6 - 8 ถุง กินน้ำของคุกழิเหลวจะไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ไม่ได้ 3.2 ใช้สารฆ่าแมลงไนโตรไซน์ 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร ราดบริเวณคุกழิพืชตัวเดียวโดยต้องลงมาให้เขยิกโดยใช้เบร์มิด 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบบด	แสดงผล เศียรจะทำลายตัวและลดลงพืชราก 3. ต้นมะพร้าวอายุ 3 - 5 ปี ที่ยังไม่สร้างรากใหม่ ใช้คุกழิเน็นสับรีบผลก่อนพืชรากต้นหางไปบรรบบฯ ยอดอ่อน ทางลง 2 ถุงตันละ 6 - 8 ถุง กินน้ำของคุกழิเหลวจะไม่ได้ไม่ได้ 3. ใช้สารฆ่าแมลงไนโตรไซน์ 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 2 ลิตร ราดบริเวณคุกழิพืชตัวเดียวโดยต้องลงมาให้เขยิกโดยใช้เบร์มิด 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบบด

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				<p>การทำลายรุนแรงจะพบว่า หนอนหัวดำ มะพร้าวทำลายก้านทางใบ จั่น และผล มะพร้าว ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ มะพร้าวลงทำลายทางใบหลาย ๆ ทาง พบร่วม หนอนหัวดำมะพร้าวจะถักไยดึงใบมะพร้าว มาเรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่ แล้วจะถักไยหุ้มลำตัวอีกรัง และเข้าดักแด้ อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้เมื่อสีน้ำตาลเข้ม ดักแด้ เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมีย เล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวที่ผสม พันธุ์แล้วจะวางไข่บนเส้นใยที่สร้างเป็นอุโมงค์ หรือชาดใบที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลง ทำลายแล้ว ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะ[*] อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1 - 2 วัน ก่อนจะย้ายไป กัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบหนอนหัวดำ มะพร้าวหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าว ใบเดียวกัน หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ ต้นมะพร้าวตายได้</p>	<p><i>nephantidis</i>) โดยปล่อยช่วงเวลาเย็น พlob คำ อัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ให้กระจายทั่ว แปลงเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยแต่นเป็นได้มาก จะทำให้เห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้น</p> <p>3. การใช้สารเคมี</p> <p>3.1 ใช้สารอีมามากติดนบนโซโลต 1.92% EC เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้ำฉีดเข้าที่ลำต้น มะพร้าวอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้ สว่านเจาะรูให้อุ่งลงประมาณ 45 องศา[*] จำนวน 2 รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรูให้ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ตำแหน่งของรูอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้ำมัน วิธีนี้จะป้องกันกำจัดหนอน หัวดำมะพร้าวได้นานมากกว่า 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถป้องกันกำจัดศัตรูชนิดอื่นได้ ด้วย เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงวงมะพร้าว แมลงด้านนามะพร้าว) **** แนะนำเฉพาะมะพร้าวที่มีความสูง มากกว่า 12 เมตร ขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าว</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>น้ำหอม มะพร้าวแกะทิ และมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล</p> <p>3.2 กรณีมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวแกะทิ มะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล ในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดูดซึมน้ำ ไม่มีการปล่อยแต่นเป็นน้ำ ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสารฟลูบีนไดอะมิร์ 20% WG อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ ลูเพนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อ昆蟲 ไม่ควรใช้บริเวณที่มีการเลี้ยง昆蟲) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่กำหนดผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 30 บาร์ กรณีที่มีการปล่อยแต่นเป็นน้ำ ให้พ่นสารเคมีก่อนประมาณ 2 สัปดาห์ ค่อยทำการปล่อยแต่นเป็นน้ำ กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนองหัวดำมะพร้าว</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกัน
8. ทุเรียน	เตรียมต้น (การเจริญทางใบ)	โรครา肯เน่าและ โคนเน่า (เชื้อรา <i>Phytophthora palmivora</i>)		<p>อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีเสื่อม ไม่เป็นมันเงา เที่ยงลุ่ง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ใบจะเหลืองและหลุดร่วง หากชุดดูราก จะพบ รากฝอยมีลักษณะเปลือกกล่อน และเปื่อยยุ่ย เป็นสีน้ำตาล เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะตาม ไปยังรากแขนงและโคนต้น ทำให้ต้นทุเรียน โทรมและยืนต้นตาย</p> <p><u>อาการที่กิ่งและลำต้นหรือโคนต้น ระยะแรก</u> จะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคล้ายครรภาน้ำบนผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น ในช่วงเข้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นเป็น หยดของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมานอกจาก บริเวณแผล และจะค่อย ๆ แห้งไปในช่วงที่มี డัดจัด ทำให้เห็นเป็นคราบ เมื่อใช้มีดถูก บริเวณคราบนั้น จะพบเนื้อเยื่อเปลือกและ เนื้อไม้เป็นแผ่นสีน้ำตาล ถ้าแผลขยายใหญ่ ลูกสามารถรอบโคนต้น จะทำให้ทุเรียนใบรวม จนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย</p> <p><u>อาการที่ใบ</u> ใบอ่อนแสดงอาการเที่ยว เหลือง</p>	<p>1. แปลงปลูกครัวมีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง และเมื่อมีน้ำท่วมขังควรรีบ ระบายนอก</p> <p>2. ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ ปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.5 กรณีดินที่เป็นกรดจัด ให้ใส่ ปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่</p> <p>3. หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้รากหรือ ลำต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อรา สาเหตุโรคเข้าทำลายพืชได้ง่ายขึ้น</p> <p>4. ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้น แห้งตาย ควรขุดออกนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วรดน้ำในหลุมและบริเวณโดยรอบ ด้วย สารป้องกันกำจัดโรคพืช พอสอทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทึ้งไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูก ทดแทน</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				<p>บริเวณแพลงเมลักษณจะมีน้ำ สีน้ำตาลอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีดำ ตายน้ำคล้ายน้ำร้อนลวก เส้นใบมีสีน้ำตาลดำ เกิดอาการไหม้แห้งคات้นอย่างรวดเร็วแล้วค่อย ๆ ร่วงไป พับมากช่วงผนตกรหงส์ต่อเนื่องหลายวัน</p>	<p>5. ตรวจแพลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบส่วนของกิ่ง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแพลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารเคมีแลกซิล 25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วทั่วพุ่ม จำนวน 1 - 2 ครั้ง ทุก 7 - 10 วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผล อย่างน้อย 15 วัน</p> <p>6. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อ กับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง</p> <p>7. เมื่อพบต้นที่ใบเริ่มมีสีเขียว ไม่เป็นมันเงาหรือใบเหลืองหลุดร่วง ใช้สาร พอสโพนิก แอซิด 40% SL ผสมน้ำสะอาด อัตรา 1:1 ใส่ระบบอกรดยาฉีดเข้าลำต้น อัตรา 20 มิลลิลิตรต่ot้น และ/หรือราดดินด้วยสารพอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเคมีแลกซิล 25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>8. เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือท่อนั้น ถาก หรือขุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้ว ทาแพลงด์ด้วยสาร พอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 70 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ¹ พอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 90 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ เมทาแอลกอฮอล 25% WP อัตรา 40 - 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ² แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ³ โพรพาโนมาร์บไยโตรคลอไรด์ + เมทาแอลกอฮอล 10% + 15% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแมลงจะแห้ง หรือ ใช้ฟอสฟอนิก แอซิด 40% SL ผสมน้ำสะอาด อัตรา 1:1 ใส่ กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อด้าม ฉีดเข้าลำต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้ามอาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีกลับบริเวณที่เป็นโรค 9. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่ง เป็นโรค กิ่งแห้ง และตัดขั้วผลที่ค้างอยู่ นำไป ทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของ เชื้อสาเหตุโรค</p>