




ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2568

ระวังแมลงวันทองพริกทำลาย

ลักษณะอาการ

เดือนผู้ปลูกพริก ในระยะเก็บเกี่ยว รับมือแมลงวันทองพริก ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสี ไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกตกินชอนไชอยู่ภายในผล ทำให้ผลพริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่ จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน



การป้องกันกำจัด

1. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นเผาทำลาย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ ของแมลงวันทองพริก
2. ใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เน้นพ่นที่ ผลพริกทุก 5-7 วัน ในกรณีพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำ พ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วัน
3. เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถวต้นละจุดห่างกันแถวละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรือ เทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้แมลงสามารถบินเข้า กับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพื้นดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก
4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร



ที่มา : กรมวิชาการเกษตร เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 034-259613 Facebook : อารักขาพืช นครปฐม




ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2568

สวนมะพร้าวระวัง

หนอนหัวด้ามะพร้าวทำลาย

ลักษณะอาการ

เดือนผู้ปลูกมะพร้าว ในระยะยังไม่ให้ผลผลิต และให้ผลผลิตแล้ว รับมือหนอนหัวด้ามะพร้าว ตัวหนอนเข้าทำลาย ใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะชักใยนำมูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้นนำมาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมลำตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่ในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบ



การป้องกันกำจัด

- 1). วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอนหัวด้ามะพร้าวเข้าไปเผาทำลายทันที ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์
- 2). การใช้ชีววิธี การใช้แตนเบียน เช่น แตนเบียนหนอนบราคอนโดยปล่อยช่วงเวลาเย็น พลบค่ำ อัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ให้กระจายทั่วแปลงเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยแตนเบียนได้มากจะทำให้เห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้น
- 3). การใช้สารเคมี

3.1) ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้ำฉีดเข้าที่ลำต้นมะพร้าวอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่านเจาะรูให้เอียงลงประมาณ 45 องศา จำนวน 2 รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรูให้ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ตำแหน่งของรูอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้ำมัน วิธีนี้จะป้องกันกำจัด หนอนหัวด้ามะพร้าวได้นานมากกว่า 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถป้องกันกำจัดศัตรูชนิดอื่นได้ด้วย เช่น ด่างแรดมะพร้าว ด่างวง มะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว)

** แนะนำเฉพาะมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล

3.2) กรณีมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานีลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปีโนแซด 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ ลูเฟโนซูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่กำหนดผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 30 บาร์ กรณีที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ ค่อยทำการปล่อยแตนเบียน กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวด้ามะพร้าวสามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกัน



ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 034-259613 Facebook : อารักขาพืช นครปฐม



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2568

ระวัง หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด ในข้าวโพด

(ข้าวโพดฝักสด, ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดเทียน, ข้าวโพดข้าวเหนียว)

ลักษณะอาการ

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกข้าวโพด (ข้าวโพดฝักสด, ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดเทียน, ข้าวโพดข้าวเหนียว) ในระยะ ระยะออกดอก-ติดฝัก รับมือหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด ในระยะออกดอก หนอนจะเจาะเข้าไปกินส่วนยอดที่ม้วนอยู่ โดยกัดกินและเจริญเติบโตภายในช่อดอก ทำให้ช่อดอกไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ จึงมีเกษตรกรผู้ไม่เพียงพอดต่อการผสมเกสร ฝักที่ได้จะไม่เต็มเม็ด หรือมีเมล็ดไม่เต็มฝัก ทำให้ผลผลิตต่ำ การเข้าทำลายฝัก ตัวหนอนเข้าทำลายโดยการเจาะที่ก้านฝัก หรือโคนฝัก หากมีการระบาดรุนแรงมากจะเจาะกินภายในแกนกลางฝัก และเมล็ดด้วย



การป้องกันกำจัด

1. พ่นสารฆ่าแมลงคลอร์ฟลูอาซารอน 5% EC อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

หรือ ฟิโปรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

(- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะออกดอก พ่นสารเมื่อพบหนอน 2 ตัวต่อต้น หรือ รูเจาะ 2 รูต่อต้น -

ข้าวโพดหวานในระยะออกดอก พ่นสารเมื่อพบหนอนมากกว่า 50 ตัว หรือ รูเจาะ 50 รู จากข้าวโพด 100 ต้น)



ที่มา : กรมวิชาการเกษตร เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 034-259613 Facebook : อารักขาพืช นครปฐม



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2568

สวนไม้ผลเตรียมป้องกัน

แมลงวันทองผลไม้

ลักษณะอาการ

ตัวเต็มวัยวางไข่ในผลไม้ ตั้งแต่ระยะผลอ่อนไปจนกระทั่งผลสุก ตัวหนอนแมลงวันทองจะกัดกินชอนไชอยู่ภายในผลจน เป็นโพรง ทำให้ผลเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโต เต็มที่จะเจาะออกมาเพื่อเข้าดักแด้ในดินต่อไป



การป้องกันกำจัด

- 1). รักษาความสะอาดแปลงปลูกโดยเก็บผลที่เน่าเสียออกจากแปลง และนำไปฝังกลบที่ระดับความลึกจากหน้าดิน 15 ซม. หรือเผาเพื่อ ลดการสะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก
- 2). ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่ม ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ และเอื้อให้ศัตรูธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในแปลงปลูกมีบทบาทในการทำลายแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้น
- 3). ห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกใสขนาด 5x9 นิ้ว ตัดมุมถุงด้านล่างขนาด ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร เพื่อระบายน้ำและอากาศ
- 4). ติดกับดักโดยใช้สารล่อชนิดเมทิลยูจินอล ผสมด้วยสารฆ่าแมลง มาลาไธออน 83% อีซี ในอัตรา 4:1 โดยปริมาตร หยดลงบนก้อนสำลี 3-5 หยดแขวนกับดักในทรงพุ่มสูงประมาณ 1 เมตร จำนวน 2 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อสำรวจการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก และกำจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ โดยถ้าพบปริมาณแมลงวันผลไม้เพิ่มมากขึ้น ในกับดัก โดยเฉพาะช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ดำเนินการพ่นเหยื่อพิษโปรตีน
- 5). พ่นเหยื่อพิษโปรตีนไฮโดรไลเซต อัตราเหยื่อโปรตีน 200 มิลลิลิตร ผสมสารกำจัด

