



โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดจากอะไร ?

เป็นโรคที่เกิดในสัตว์กีบคู่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย มี 7 ชนิด ในประเทศไทย พบ 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดโอ เอ และเอเซียวัน (ชนิดเอเซียวัน พบระบาดครั้งสุดท้าย ปี พ.ศ.2540)

“ปศุสัตว์ปทุมธานี KICK OFF กิจกรรมการณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย”

21 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์ปทุมธานี KICK OFF กิจกรรมการณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร รวมทั้งทำลายเชื้อโรคในพื้นที่รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อให้สัตว์ในพื้นที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี และมีระดับภูมิคุ้มกันระดับฝูงที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ ตลอดจนลดอุบัติการณ์ของโรคปากและเท้าเปื่อยลง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรค และมีความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดได้ ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีไม่พบการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์



“ การป้องกัน โรคปาก และเท้าเปื่อย ทำได้ อย่างไร? ”

- งดการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่จากโคที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือจากพื้นที่ที่มีโรคระบาด
- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คอกเลี้ยงโคและโรงรีดนม
- ห้ามยาพาหนะเข้าฟาร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่มีการเข้าฟาร์มหลายแห่ง เช่น รถขนขี้วัว รถรับซื้อโค รถขนฟาง รถขนอาหาร เป็นต้น
- เลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีโรคปากและเท้าเปื่อยระบาด
- ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคที่โรงเรือน ถังนม และอุปกรณ์ต่างๆ



สัตว์ที่ติดเชื้อมีอาการอย่างไร?

สัตว์ติดเชื้อ แสดงอาการความรุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานโรค ความแข็งแรงของตัวสัตว์และปริมาณเชื้อโรค
อาการ : ซึม ไข้สูง น้ำลายไหล มีเม็ดตุ่มใสฟูพองเกิดขึ้นภายในปาก ลิ้น เหงือก เพดานปาก ข้างแก้ม ซอกกีบ ต่อมาเม็ดตุ่มจะแตกเป็นแผล สัตว์แสดงอาการขาเจ็บ เดินกระเผลก น้ำลายไหลมากขึ้น มีแผลในปาก ลิ้น เท้า และหัวนม