



เตือนการระบาด

(21 กุมภาพันธ์ 2567)

เพลี้ยแป้งในส้มโอ



ดูดกินน้ำเลี้ยงบนกิ่งใบ และขั้วผลของส้ม ถ้าหากมีการระบาดปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต เพลี้ยแป้งสามารถผลิตน้ำหวานซึ่งเป็นอาหารของราดำ ส่งผลให้ผลผลิตมีตำหนิในสภาพอากาศแห้งแล้งจะทำให้การระบาดเร็วขึ้น

ลักษณะการทำลาย


ผลอ่อน

ทำให้ผลแคระแกรนเนื้อในแข็งหยุดการพัฒนาแล้วร่วงหล่น

ช่วง

ผลแก่

ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อ แต่มีผลกระทบกับผิวส้มโอ สาเหตุจาก **ราดำ**



การป้องกันกำจัด



- ✓ หากพบการระบาดไม่มาก อยู่เป็นกลุ่มตามส่วนต่างๆ ให้ตัดส่วนที่พบไปทำลายนอกแปลง
- ✓ หากพบการระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% WP อิมิดาโคลพรีด 10% SL คาร์โบซัลเฟน 20% EC
- ✓ ป้องกันมด ซึ่งเป็นตัวนำเพลี้ยแป้งไปยังผล โดยใช้ผ้าชุบน้ำมันเครื่องผูกกรอบโคนต้น ป้องกันมด และเพลี้ยแป้งไต่ขึ้นมา

