



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาค

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. 64 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 64



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
-ไม่มีฝนตก-				

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคนิคในโลยสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 59,030 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,099 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (48,086 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,944 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 50.39 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 81.86 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,083 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 54,422 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 30,880 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2563 (43,949 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62) มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,473 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 35.12 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 64.15 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,547 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	14,343	58	7,598	42	75	1,001	826	83	727	81	83	25,825	15,169	59	8,326	44	10,656
ตอน.	12	8,368	7,027	84	5,376	80	218	2,002	1,761	88	1,610	87	230	10,370	8,788	85	6,987	82	1,611
กลาง	3	1,419	1,412	101	1,352	100	22	369	364	99	339	98	25	1,788	1,776	99	1,692	99	14
ตะวันตก	2	26,605	23,973	90	10,696	80	7	140	147	105	138	105	9	26,745	24,120	90	10,835	80	2,625
ตะวันออก	6	1,515	1,320	87	1,221	86	51	964	952	99	900	99	57	2,479	2,272	92	2,121	91	219
ใต้	4	8,194	6,346	77	4,636	72	39	668	558	84	505	82	43	8,863	6,904	78	5,140	72	1,958
รวม	35	70,926	54,422	77	30,880	65	412	5,144	4,608	90	4,219	89	447	76,071	59,030	78	35,099	67	17,083

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14,739 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 8,043 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 4.08 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 24.54 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,132 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,394	62	4,594	48	0.00	5.91	14.50	14.50	5,068
สิริกิตี	4,478	47	1,628	24	2.57	2.70	5.52	5.65	5,032
ภูมิพล+สิริกิตี	12,871	56	6,221	38	2.57	8.61	20.02	20.15	10,101
แควน้อยฯ	917	98	874	98	0.81	0.80	3.02	3.02	22
ป่าสักชลสิทธิ์	951	99	948	99	0.70	0.00	1.50	1.51	9
รวมทั้งหมด	14,739	59	8,043	44	4.08	9.41	24.54	24.68	10,132

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 2 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯสิริกิตี (24%) และอ่างฯแม่ทองสุคนธ์ (28%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 24 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯก๊วกม(95%) อ่างฯก๊วกคหมา(85%) อ่างฯแควน้อยบางแดน (98%) อ่างฯแม่มอก(100%) อ่างฯจุฬารักษ์(98%) อ่างฯอุบลรัตน์(95%) อ่างฯลำตะคอง(108%) อ่างฯลำพระเพลิง(99%) อ่างฯมูลบน(100%) อ่างฯลำแชะ(101%) อ่างฯลำน้ำรอง(97%) อ่างฯสิรินธร(90%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์(99%) อ่างฯทับเสลา(101%) อ่างฯกระเสียว(100%) อ่างฯศรีนครินทร์(92%) อ่างฯวชิราลงกรณ(86%) อ่างฯขุนด่านปราการชล(97%) อ่างฯบางพระ(96%) อ่างฯหนองปลาไหล (107%) อ่างฯประแสร์(97%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา(96%) อ่างฯแก่งกระจาน(90%) อ่างฯปรานบุรี(91%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำมูล แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 244 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 253 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.34 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.86 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 75 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.72 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.91 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.44 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.49 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 82 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 70 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 11 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก ปิด (เมื่อวาน ปิด) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 51 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 51 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 10 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 19 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 91 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 109 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทอง) 6 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 35 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 35 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 15 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 169 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 182 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		3 ธ.ค.64	4 ธ.ค.64	5 ธ.ค.64	6 ธ.ค.64	7 ธ.ค.64	8 ธ.ค.64	9 ธ.ค.64		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 9 ธ.ค. 64	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.98	-10.82
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.53	-11.47
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.62	-10.58
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.45	-10.55
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.89	-10.61
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.20	-11.30

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dhw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำป็นาปรัง พืชไร่ อุดมโคกบริโกล (วันที่ 9 ธ.ค.64)

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำป็นาปรัง พืชไร่ อุดมโคกบริโกล และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 294 เครื่อง แบ่งเป็น

- o ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 109 เครื่อง ในพื้นที่ 18 จังหวัด
- o ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 86 เครื่อง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
- o อุทกภัย จำนวน 99 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

4.2 การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย (ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - ปัจจุบัน)

เนื่องจากอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” และ “เตี้ยนหมู่” และพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 - ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จำนวน 61 จังหวัด 350 อำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

ช่วงภัย 26 ส.ค. - 2 พ.ย. 64

- กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 424 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 430 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ 77 เครื่อง
- กรมปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ 1,912,260 ตัว (เคลื่อนย้ายสัตว์กลับสู่คอกทั้งหมดแล้ว) สนับสนุนหญ้าพระราชทาน 1,123.4 ตัน หญ้าหมัก 19.8 ตัน สนับสนุนอาหาร TMR 106.9 ตัน สนับสนุนแร่ธาตุ 901 ก้อน กล้วยพืชสัตว์ 1,988 กล้วย เสริมสุขภาพสัตว์ 82,115 ตัว และรักษาสัตว์ 1,324 ตัว
- กรมประมง ได้สนับสนุนเรือตรวจการ 39 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 170 ราย พร้อมมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1.6 ล้านตัว
- กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่ง พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย 307,374 ลิตร
- กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเชื้อเรือไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 89,287 กิโลกรัม ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 22,117 ราย นำไปใช้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 86,145 ไร่

ช่วงภัย 6 พ.ย.64 - ปัจจุบัน

- กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 207 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 184 เครื่อง เครื่องจักรอื่นๆ 28 เครื่อง
- กรมปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ 17,626 ตัว สนับสนุนหญ้าพระราชทาน 269.5 ตัน หญ้าหมัก 2.2 ตัน กล้วยพืชสัตว์ 447 ชุด เสริมสุขภาพสัตว์ 82,115 ตัว
- กรมประมง ได้สนับสนุนเรือตรวจการ 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 15 ราย

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย. - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 60,020 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 76,528 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,417 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,650 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 57,460 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 463 ราย พื้นที่เสียหาย 2,103 ไร่ คิดเป็นเงิน 4.00 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 2,066 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4,320 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,440 ไร่ บ่อกุ้ง 2,880 ไร่ กระชัง 3,763 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 24,889 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,753,423 ตัว แบ่งเป็น โค 61,835 ตัว กระบือ 1,002 ตัว สุกร 75,753 ตัว แพะ/แกะ 7,744 ตัว สัตว์ปีก 1,607,423 ตัว แปลงหญ้า 6,579 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

5.2 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช พบความเสียหาย 51 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี และจังหวัดระนอง เกษตรกร 323,365 ราย พื้นที่ 3,314,853 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,281,696 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,012,856 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 20,301 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,145.10 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 2,684 ราย พื้นที่ 13,802 ไร่ คิดเป็นเงิน 22.88 ล้านบาท**

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 20,158 ราย พื้นที่ 36,367 ไร่ กระชัง 18,847 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 503.56 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 2,847 ราย พื้นที่ 2,292 ไร่ กระชัง 1,370 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 13.69 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 1,593 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 95,825 ตัว แปลงหญ้า 277 ไร่ คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 413 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 25,162 ตัว คิดเป็นเงิน 5.65 ล้านบาท**

5.3 วาดภัย ช่วงภัยวันที่ 8 – 30 ก.ย.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู และจังหวัดพังงา เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ 838 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 42.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 425 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 370 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.40 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 382 ราย พื้นที่ 572 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.34 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. – 24 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ เลย จันทบุรี ระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 1,482 ราย พื้นที่ 7,968 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,564 ไร่ พืชไร่ 5,236 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 168 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.15 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง พบความเสียหาย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก เลย สระบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 851 ราย พื้นที่ บ่อปลา 1,806 ไร่ วงเงิน 7.63 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 531 ราย พื้นที่ 322 ไร่ วงเงิน 1.36 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 29 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 744 ตัว คิดเป็นเงิน 18,600 บาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

5.5 ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – 31 ส.ค.64

ด้านพืช พบความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 10,416 ราย พื้นที่ 165,374 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 112,955 ไร่ พืชไร่ 52,419 ไร่ คิดเป็นเงิน 180.44 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 3,535 ราย พื้นที่ 40,176 ไร่ คิดเป็นเงิน 40.59 ล้านบาท**

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 64)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคไหม้ข้าว 3. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 4. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตากและอ่างทอง) จำนวน 260 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 227 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และสงขลา) จำนวน 63 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 225 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบุรี) จำนวน 4 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 36 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี) จำนวน 66 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 28 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตรายายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวอเรีย รมรงค์ ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตรายายสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต และลดปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยของ โรค แมลง ศัตรูพืช ในนาข้าว
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. ไรสีขา 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ ระบาด 21 จังหวัด (ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต สตูล สงขลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,500 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 154 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (อำนาจ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,068 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 260 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,154 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 407 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม พังงา สงขลา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,220 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 741 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสงขลา) จำนวน 1,020 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 339 ไร่ พื้นที่ ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 155 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่	- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ไปเผาทิ้ง นอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่ - ปลอ่ยกแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อ ควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยกแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กัฏักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัว เต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไร เซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด ใน ระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ไล่สีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ในช่วงผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารรถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติด จันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไล่สีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตาม คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร สตูล และ นครศรีธรรมราช) จำนวน 648 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 808 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กระบี่ และสตูล) จำนวน 169 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะ ตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา ชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา) จำนวน 103 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (กระบี่ ตรัง นราธิวาส พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 375,088 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 44,910 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (น่าน กระบี่ ยะลา และสตูล) จำนวน 1,835 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 655 ไร่	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้ อย่างต่อเนื่อง - คำนวณนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุด คูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาตคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้าง ละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไป ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา สีดพื้น บริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. โรคโคนเน่าหัวเน่า 3. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ น่าน สกลนคร ชัยนาท จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 167 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 73 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (น่าน) จำนวน 7 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 122 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และลพบุรี) จำนวน 13,884 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 14 ไร่	- รมรณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงข้างปีกใส่ และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและ ดักแด้แมลงหนอนหลว รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดย ใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน และให้ หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบ ด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - โรคโคนเน่าหัวเน่า แนะนำเกษตรกรเก็บเศษหัว หรือเศษซาก มันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกล การเกษตร ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แช่ท่อน พันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ปลายจุด (fall armyworm) 2. หนอนเจาะลำต้น	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ ยโสธร จันทบุรี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 382 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 65 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลง ติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดปลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้ สารเคมีควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของกรม วิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- แนะนำให้เกษตรกรสำรวจและทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชข้างเคียง เพื่อทำลายพืชอาศัย และหากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งระยะรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ เกษตร เช่น ไทอะมีโทแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออะเซทาไมพริด ๒๐% เอสพี อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นเป็นวงรีสม่ำเสมอ บริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง และต้องหยุดพ่นในช่วงที่สับปะรดติดผลอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพืชตกค้าง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และกระบี่) จำนวน 110 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 105 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 225 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,645 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 538 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง เฉพาะต้น - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และปราจีนบุรี) จำนวน 98 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 280 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 28 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 325 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตาก และจันทบุรี) จำนวน 207 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 195 ไร่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากพบการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บีโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9 % อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
			มิลลิเมตรต่อน้ำ 20 ลิตรใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องถูกรอบโคนต้น ป้องกันเกลี้ยแปง และมดใต้ขึ้นมาบนต้น - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และไข่มาทำลาย ใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียน หรือใช้สารฆ่าแมลง ได้แก่ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 45 - 6๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แลมป์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5%อีซี อัตรา 10 มิลลิเมตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 64)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2564 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 8 จุด ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และกำแพงเพชร ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคล้มปัสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 64)

พบการระบาดของสัตว์ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 2 ธ.ค. 64 รวม 68 จังหวัด 861 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 596,371 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 23,927 ตัว สัตว์ตายสะสม 59,319 ตัว รายละเอียดดังนี้

พบการระบาด	จำนวนสัตว์ป่วยสะสม/จำนวนสัตว์ตายสะสม
โคนม	กรุงเทพฯ(3/2) ชัยนาท(36/2) ลพบุรี(239/16) สระบุรี(78/3) ชลบุรี(14/0) สระแก้ว(2,218/130) จันทบุรี(11/7) ชัยภูมิ(171/32) นครราชสีมา(1,179/82) บุรีรัมย์(902/49) ศรีสะเกษ(80/4) สุรินทร์(84/9) กาฬสินธุ์(17/2) ขอนแก่น(776/178) นครพนม(2/0) มหาสารคาม(293/38) เลย(249/9) สกลนคร(682/50)หนองบัวลำภู(47/3) อุตรดิตถ์(374/51) เชียงราย(729/58) เชียงใหม่(180/45)แพร่(6/0) ลำปาง(107/16) ลำพูน(515/73) พิจิตร(102/1) พิษณุโลก(2/1) เพชรบูรณ์(31/8) สุโขทัย (301/17) กาญจนบุรี(184/20) นครปฐม(95/1) ประจวบคีรีขันธ์(1,015/72) เพชรบุรี(268/35) ราชบุรี(967/48) สุพรรณบุรี(37/10) ชุมพร(11/4)
โคนม	กรุงเทพฯ (102/6) นนทบุรี (4/0) ชัยนาท(2,445/509) ปทุมธานี(304/9) อโยธยา(180/23) ลพบุรี(1,313/170) สระบุรี(419/44) สิงห์บุรี(121/18)อ่างทอง(545/104) ฉะเชิงเทรา(503/51) ชลบุรี(275/18) ปราจีนบุรี(175/24) สมุทรปราการ(4/0) สระแก้ว(7,848/588) จันทบุรี(28/9) ตราด(75/4) นครนายก (2/0) ชัยภูมิ(6,657/1,036) นครราชสีมา(49,651/2,664) บุรีรัมย์(62,264/5,273) ยโสธร(2,673/116) ศรีสะเกษ(31,838/1,316) สุรินทร์(52,006/5,125) อำนาจเจริญ(11,631/1,830) อุบลราชธานี(42,718/5,689) กาฬสินธุ์(24,153/2,445) ขอนแก่น(31,938/3,906) นครพนม(8,481/705) บึงกาฬ(2,231/326) มหาสารคาม(35,092/6,459) มุกดาหาร(25,305/859) ร้อยเอ็ด(57,035/5,958) เลย(3,595/207) สกลนคร(22,557/2,432) หนองคาย(4,332/410) หนองบัวลำภู(3,903/422) อุตรดิตถ์(14,589/1,578) เชียงราย(1,005/48) เชียงใหม่(349/25) น่าน(1,834/97) พะเยา(279/16)แพร่(827/87) ลำปาง(3,203/229) ลำพูน(238/35) ตาก(21,446/1,183) นครสวรรค์(1,612/227) พิจิตร(496/46) พิษณุโลก(3,864/147) เพชรบูรณ์(1,734/202) สุโขทัย(2,905/711) อุตรดิตถ์(678/156) อุทัยธานี(283/42) กำแพงเพชร(133/19) กาญจนบุรี(10,147/978) นครปฐม(336/34) ประจวบคีรีขันธ์(4,511/420) เพชรบุรี(5,487/774) ราชบุรี(1,944/85) สุพรรณบุรี(6,504/858) สมุทรสาคร(49/1) สมุทรสงคราม(153/0) ชุมพร(886/110) กระบี่(62/1) สุราษฎร์ธานี(206/12) พัทลุง(92/1) นครศรีธรรมราช(77/1) ยะลา(11/1) สงขลา(176/0)
กระบือ	กรุงเทพฯ (2/2) ชัยนาท(3/0) ปทุมธานี(1/0) ลพบุรี(2/0) สระแก้ว(18/9) ชัยภูมิ(21/6) นครราชสีมา(60/5) บุรีรัมย์(433/76) ศรีสะเกษ(49/6) สุรินทร์(264/57) อำนาจเจริญ(1/4) อุบลราชธานี(248/34) กาฬสินธุ์(88/39) ขอนแก่น(422/107) นครพนม(83/0) บึงกาฬ(17/4) มหาสารคาม(203/93) มุกดาหาร(32/5) ร้อยเอ็ด(981/52) เลย(10/3) สกลนคร(318/48) หนองคาย(44/10) หนองบัวลำภู(46/4) อุตรดิตถ์(61/9) น่าน(2/0) ตาก(11/3) พิษณุโลก(28/1) เพชรบูรณ์(4/0) สุโขทัย (2/0) กาญจนบุรี(1/1) ประจวบคีรีขันธ์(1/0) ราชบุรี(1/0) สุพรรณบุรี(10/0) สุราษฎร์ธานี(1/0)
กระต่าย	ประจวบคีรีขันธ์(1/0)

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคแก่ตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคหรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 196,827 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 37,094 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 224,781 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 169,953 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 127,825 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 415,503 ราย

7.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2564) พบการระบาด 43 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 22 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในสุกร 14 ครั้ง ที่ประเทศฮังการี แอฟริกาใต้ เยอรมนี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
 - ในหมูป่า 1 ครั้ง ที่ประเทศลาว
 - ในสุกร/หมูป่า 7 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย รัสเซีย
- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง(H5N1) 14 ครั้ง ในสัตว์ปีก/นก ที่ประเทศอินเดีย โครเอเชีย ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์

ฮังการี เยอรมนี นอร์เวย์ สโลวาเกีย อังกฤษ

- โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง(H5N8) 1 ครั้ง ในสัตว์ปีก ที่ประเทศญี่ปุ่น
- โรคไข้หวัดนก 4 ครั้ง ในสัตว์ปีก/นก ที่ประเทศรัสเซีย เบลเยียม
- โรคระบาดสัตว์อื่นๆ 2 ครั้ง แบ่งเป็น
 - โรค Anthrax 1 ครั้ง ในโคเนื้อ ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน
 - โรค SARS-COV-2 1 ครั้ง ในสิงโต ที่ประเทศโครเอเชีย