



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 16 มีนาคม 2565 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าว มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางแห่ง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 15 มี.ค. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 16 มี.ค. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.สองแคว	น่าน	34.50	ฝนตกปานกลาง
2	อ.เมือง	บึงกาฬ	26.50	ฝนตกปานกลาง
3	อ.เมือง	เลย	20.60	ฝนตกปานกลาง
4	อ.ทุ่งช้าง	น่าน	18.90	ฝนตกปานกลาง
5	อ.เมือง	อุดรธานี	16.90	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 65)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 49,687 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 25,750 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (39,890 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) มากกว่าปี 2564 จำนวน 9,797 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 34.81 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 150.01 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,398 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 46,137 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 22,594 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (36,947 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) มากกว่าปี 2564 จำนวน 9,189 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 28.82 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 135.32 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 24,790 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	11,516	46	4,771	26	75	1,001	657	66	558	62	83	25,825	12,173	47	5,329	28	13,653
ตอน.	12	8,368	4,881	58	3,230	48	218	2,009	1,274	63	1,116	60	230	10,377	6,155	59	4,347	51	4,222
กลาง	3	1,419	864	61	804	59	22	369	248	67	223	65	25	1,788	1,112	62	1,027	60	676
ตะวันตก	2	26,605	22,130	83	8,853	66	7	147	119	81	110	80	9	26,752	22,249	83	8,963	67	4,504
ตะวันออก	6	1,515	796	53	696	49	51	964	666	69	614	67	57	2,479	1,462	59	1,310	56	1,017
ใต้	4	8,194	5,951	73	4,241	65	39	668	586	88	533	87	43	8,863	6,537	74	4,774	67	2,326
รวม	35	70,926	46,137	65	22,594	48	412	5,158	3,550	69	3,155	66	447	76,084	49,687	65	25,750	49	26,398

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11,615 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 4,919 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 7.40 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 33.89 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,256 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,497	48	2,697	28	2.84	0.00	14.00	14.00	6,965
สิริกิตี	3,999	42	1,149	17	3.12	3.08	12.06	12.04	5,511
ภูมิพล+สิริกิตี	10,497	46	3,847	24	5.96	3.08	26.06	26.04	12,475
แควน้อยฯ	593	63	550	61	1.44	1.44	4.32	4.32	346
ป่าสักชลสิทธิ์	526	55	523	55	0.00	0.00	3.51	3.48	434
รวมทั้งหมด	11,615	47	4,919	27	7.40	4.52	33.89	33.84	13,256

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 4 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (28%) อ่างฯ สิริกิตี (17%) อ่างฯ แม่ทองสุก (29%) และอ่างฯ คลองสีไยต์ (18%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 7 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ลำพระเพลิง (84%) อ่างฯ ลำนางรอง (86%) อ่างฯ กระเสียว (87%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (88%) อ่างฯ บางพระ (81%) อ่างฯ หนองปลาไหล (81%) และ อ่างฯ บางยาง (90%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 216 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 228 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.18 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.02 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 75 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.15 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.26 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.44 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 79 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 66 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 10 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 4 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 31 ลบ.ม. (เมื่อวาน 32 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 55 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 55 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 11 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสวภาค) 17 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 86 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 40 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 10 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 107 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 107 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		10 มี.ค.65	11 มี.ค.65	12 มี.ค.65	13 มี.ค.65	14 มี.ค.65	15 มี.ค.65	16 มี.ค.65		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.บุรี จ.นนทบุรี	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกม.ชลประทานสามเสน กทม.	0.30	0.30	0.32	0.34	0.31	0.32	0.29	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 16 มี.ค. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.65	-9.15
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	5.98	-10.02
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	2.55	-9.65
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.11	-9.89
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.31	-10.19
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.50	-12.00

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


3. การจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการจัดการน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (วันที่ 1 พ.ย.64 ถึง 30 เม.ย.65) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 37,857 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดการน้ำทั่วประเทศ จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดการน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 16,125 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนจัดการน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้ใช้น้ำไป 4,506 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 4,506 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 ของแผนจัดการน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พ.ย.64 - 30 เม.ย.65)					ผลการจัดการน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	7,442	11,785	518	22,280	16,125	72
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,000	2,415	135	5,700	4,506	79



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

ทั่วประเทศ จำนวน 11.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9.02 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.63 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 4.98 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.26 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565)

ทั่วประเทศ จำนวน 12.24 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10.35 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.89 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.06 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 0.93 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 9.42 ล้านไร่)

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 6.54 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.06 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.48 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 131.33 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 0.65 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 5.41 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2564/65			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2564/65						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	%ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอเก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.41	0.54	6.95	7.54	117.63	0.59	109.26	8.13	116.98	0.73	6.81
	นอกเขตชลประทาน	2.61	2.09	4.70	2.81	107.66	1.30	62.20	4.11	87.45	0.20	2.61
	รวม	9.02	2.63	11.65	10.35	114.75	1.89	71.86	12.24	105.06	0.93	9.42
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	2.81	0.06	2.87	4.40	156.58	0.08	133.33	4.48	156.10	0.47	3.93
	นอกเขตชลประทาน	1.45	0.66	2.11	1.66	114.48	0.40	60.61	2.06	97.63	0.18	1.48
	รวม	4.26	0.72	4.98	6.06	142.25	0.48	66.67	6.54	131.33	0.65	5.41

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 48 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 2.73 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 38 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 2.26 ล้านไร่ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครพนม บัรรัมย์ สกลนครหนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

- นอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.47 ล้านไร่ ได้แก่ เชียงราย ตาก พะเยา นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ หนองคาย กรุงเทพมหานคร ชัยนาท และสุราษฎร์ธานี

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-15 มีนาคม 2565)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ลำปาง(2) พะเยา(1) น่าน(3) แพร่(1) ตาก(1) เชียงราย(1)
กลาง	นครสวรรค์(3) กาญจนบุรี(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี(1) ชัยภูมิ(2) อุบลราชธานี(2) ยโสธร(2) นครราชสีมา(3) ศรีสะเกษ(3)
ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา(1)
ใต้	ไม่มีการขอรับบริการ
รวม	15 จังหวัด (27 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2565

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	3	1. การกักเก็บน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกักน้ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ป่าไม้ จ.ลำปาง (แจ้ห่ม งาม) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำแม่ขาม จ.ลำปาง กว๊านพะเยา จ.พะเยา 2. การกักเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงของพายุ ลูกเห็บ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ จ.เชียงใหม่(สะเมิง แม่ริม) โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตก ในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการ (15:11-18:11 น.)
2. ตาก	3	การกักเก็บน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกักน้ำ มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
3. พิษณุโลก	1	การกักเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ จ.อุดรดิตถ์(ท่าปลา) โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่หลังการปฏิบัติการ (15:25-18:25 น.)
4. แพร่	2	การกักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.น่าน(บ้านหลวง ท่าวังผา เมืองน่าน)
5. นครสวรรค์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 9,000 ฟุตขึ้นไป มีค่าต่ำกว่า 60% ส่งผลให้กลุ่มเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวช้า
6. กาญจนบุรี	2	1. การกักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ สังขละบุรี) 2. การกักเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ป่าไม้ จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ)
7. อุดรธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายก่อตัวเล็กน้อยและไม่พัฒนาตัว

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
8. บุรีรัมย์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับปฏิบัติการต่ำกว่า 60% ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสไม่พัฒนาตัวในพื้นที่เป้าหมาย
9. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศมีเสถียรภาพประกอบกับความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
รวม	11	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 6 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 100 ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 38 เที่ยวบิน (59:10 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 22.2 ตัน พลุสารพัดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 0 นัด พลุสารพัดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 0 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ สำหรับการกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 184 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก น่าน พิชณุโลก เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี และจังหวัดอุดรธานี

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,140 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง พืชไร่ อุบลโกศบริโกศ และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 115 เครื่อง แบ่งเป็น

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 11 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 17 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน (ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 65)

7.1 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัยวันที่ 17 ก.พ. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 73,421 ราย พื้นที่ 81,060 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 47,563 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 14,222 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 19,275 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 604 ราย พื้นที่ 1,374.86 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.11 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,286.22 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 82 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.89 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 1,160 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อปลา) 560 ไร่ กระชัง 11,431 ตร.ม. **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 27,998 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 476,680 ตัว แบ่งเป็น โค 59,095 ตัว กระบือ 1,895 ตัว สุกร 6,801 ตัว แพะ/แกะ 28,460 ตัว สัตว์ปีก 380,429 ตัว แปลงหญ้า 1,019 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสำรวจความเสียหายโดยหน่วยงานในพื้นที่

7.2 วาตภัย ช่วงภัย ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำพูน น่าน แพร่ สุโขทัย พะเยา อุทัยธานี ตราด กำแพงเพชร นราธิวาส และจังหวัดสตูล เกษตรกร 7,907 ราย พื้นที่ 28,098 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 27,527 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 561 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,215 ราย พื้นที่ 3,508 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 3,476 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 32 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.01 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 69 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของเกษตรกรที่ได้รับ ความเสียหาย) พื้นที่ 230 ไร่ วงเงิน 0.46 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.3 อุทกภัย ช่วงภัย ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี เกษตรกร 921 ราย พื้นที่ 4,695 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,316 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,348 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 31 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 189 ราย พื้นที่ 1,162 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 37 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,125 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.28 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.4 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 3 พ.ย. 64 – 12 ธ.ค. 64

ด้านพืช พบความเสียหาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 3,300 ราย พื้นที่ 12,943 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,237 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 5,089 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 3,616 ไร่ คิดเป็นเงิน 30.39 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,708 ราย (คิดเป็นร้อยละ 51.76 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 4,845 ไร่ วงเงิน 14.70 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 48.37 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 3,465 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9,589 ไร่ กระชัง 4,252 ตรม. คิดเป็นเงิน 52.14 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 778 ราย (คิดเป็นร้อยละ 22.74 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 771 ไร่ กระชัง 1,403 ตร.ม. วงเงิน 4.68 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.98 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 2,077 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 50,255 ตัว แบ่งเป็น โค 132 ตัว กระบือ 7 ตัว สุกร 80 ตัว แพะ/แกะ 27 ตัว สัตว์ปีก 50,009 ตัว แปลงหญ้า 95 ไร่ คิดเป็นเงิน 6.49 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 69 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) สัตว์ตาย/สูญหาย 6,519 ตัว วงเงิน 1.45 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.34 ของวงเงินช่วยเหลือ)

7.5 อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1 ก.ย. 64 – 2 พ.ย. 64

ด้านพืช พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง และจังหวัดยะลา เกษตรกร 325,954 ราย พื้นที่ 3,336,432 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,297,196 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,018,323 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 20,913 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,179.18 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 145,338 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44.59 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,363,375 ไร่ วงเงิน 2,136.38 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 41.25 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 45 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และจังหวัดระนอง เกษตรกร 23,083 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 40,814 ไร่ กระชัง 25,030 ตรม. คิดเป็นเงิน 293.29 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 14,172 ราย (คิดเป็นร้อยละ 61.40 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 25,771 ไร่ กระชัง 22,754 ตร.ม. วงเงิน 195.30 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 66.59 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร 3,328 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 196,307 ตัว แปลงหญ้า 556 ไร่ คิดเป็นเงิน 18.83 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,009 ราย (คิดเป็นร้อยละ 60.37 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) สัตว์ตาย/สูญหาย 117,962 ตัว แปลงหญ้า 232 ไร่ วงเงิน 12.28 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของวงเงินช่วยเหลือ)

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 65)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล 2. หนอนห่อใบข้าว 3. แมลงสิง 4. แมลงดำหนาม 5. โรคกาบใบแห้ง 6. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และปราจีนบุรี) จำนวน 35 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 156 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 37 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 37 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 7 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 220 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 8 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 655 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 257 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตรายการเชื้อราไตรโคเดอร์มาและชีวเวอเรีย รมรณคให้ใช้ ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่าง สม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่าง ใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึง แนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และสารเคมีอย่างถูกต้อง - แนะนำทางวิชาการแก่เกษตรกรเพื่อเป็นการป้องกันกำจัดกา รระบาดของแมลงดำหนาม และให้เกษตรกรดำเนินการฉีดพ่น สารเคมี คาร์โบซัลเฟน เพื่อป้องกันกำจัดแมลงดำหนามในพื้นที่ ที่มีการระบาด - แนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ วิธีการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันกำจัด โรค แมลง ศัตรูข้าว และแนะนำ ให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ด่างแรด 5. ด่างวง 6. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,309 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 534 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,602 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3,321 ไร่ พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,304 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 126 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พังงา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,166 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 103 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสงขลา) จำนวน 789 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 328 ไร่	- รมรณคให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ พันธุ์ - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ - ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ - ใช้กาคักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัว เต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรด ในระยะ ดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสี้ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารรถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าว ติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตาม คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,654 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 670 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร สตูล นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 660 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่</u>	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา ชนิดใหม่ 3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา) จำนวน 33 ไร่ <u>การระบาดลดลง 10 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตรัง นราธิวาส) จำนวน 1,089,055 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครสวรรค์ กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงาและสุราษฎร์ธานี) จำนวน 20,019 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1,611 ไร่</u>	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพาราที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาคว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่น โดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผิดพันบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. โรคไรแดง มันสำปะหลัง 5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 6. โรคโคนเน่าหัวเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครสวรรค์ จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 87 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 2 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชลบุรี) จำนวน 105 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 141 ไร่ <u>การระบาดลดลง 119 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา สกลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 601 ไร่ <u>การระบาดลดลง 254 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (แพร่) จำนวน 410 ไร่ <u>การระบาดลดลง 88 ไร่</u>	- รมณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagrus lopezi แผลงช่วงปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอนและดักแด้แมลงหนอนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมโดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกกลลงในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - โรคโคนเน่า แนะนำเกษตรกรเก็บเศษเหง้า หรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรมีการไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล
อ้อย	1. โรคใบขาวอ้อย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 31 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่</u>	- โรคใบขาวอ้อย แนะนำเกษตรกรในการจัดการกับต้นอ้อยที่เกิดโรค โดยให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง และในพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นจำนวนมากแนะนำให้เกษตรกรไถทำลาย และเปลี่ยนพืชปลูกก่อนหนึ่งฤดู เพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของโรค
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตาก นครสวรรค์ สงขลา และสตูล) จำนวน 7,541 ไร่ <u>การระบาดลดลง 315 ไร่</u>	- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ภายใต้กิจกรรมแปลงติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพด - รมรณรงค์ให้มีการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หากพบการระบาดระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตราด) จำนวน 49 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรณรงค์ให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และขุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร และระนอง) จำนวน 281 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 179 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (กาฬสินธุ์ จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,884 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 208 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง เฉพาะต้น - โรครากเน่าโคนเน่า แจ้างเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เงาะ	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 3 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- เพลี้ยไฟ สำรวจการเข้าทำลายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวและฝนทิ้งช่วง โดยการสุมเคาะช่อดอกบนกระดาดแข็งสีขาว หากพบเพลี้ยไฟ 2 - 3 ตัวต่อช่อ ควรทำการป้องกันกำจัดโดยพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดในระยะตั้งแต่แทงช่อดอกถึงติดผลอ่อนอย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และพังงา) จำนวน 341 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 18 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. เพลี้ยแป้ง 3. โรคราดำ 4. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 270 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 60 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 324 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 54 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 15 ไร่	- แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และทำลายแหล่งอาศัยของแมลงปากดูดที่มาขับถ่ายน้ำหวาน เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่นสารกำจัดแมลง - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

9.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 65)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 14 มีนาคม 2565 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 30 จังหวัด 141 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 18 จุด ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ และสงขลา ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

9.2 โรคลัมปีสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 65)

พบการระบาดของสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 64 - 15 มี.ค. 65 รวม 69 จังหวัด 896 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 625,197 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 18,035 ตัว สัตว์ตายสะสม 64,465 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 206,350 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 37,629 ราย 3) พนยากำจัดแมลง 225,701 ราย 4) พนยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 172,985 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 132,121 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 431,869 ราย

ที่มา : <https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/123>

9.3 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565) พบการระบาด 3 ครั้ง ดังนี้

- โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง 1 ครั้ง ในนก ที่สาธารณรัฐโปแลนด์
- โรคไขสมองอักเสบเฉียบพลัน 1 ครั้ง ในสุกร ที่เครือรัฐออสเตรเลีย
- โรคลัมปี สกิน 1 ครั้ง ในโค ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย